

## **Состав**

*действующее вещество:* тысячелистника трава (Millefolii herba);

1 пачка содержит тысячелистника травы (Millefolii herba) 50 г.

## **Лекарственная форма**

Трава.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки листьев, стеблей, корзинок и их части различной формы; серовато-зеленого цвета с белыми, коричневыми, фиолетовыми и желтыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Гемостатические средства растительного происхождения. Код АТХ В02В Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества травы усиливают свертываемость крови, оказывают противовоспалительное, бактерицидное, противоаллергическое действие, проявляют спазмолитический эффект по гладким мышцам кишечника, мочевыводящих и желчевыводящих путей.

## **Показания**

Легочные, кишечные, геморроидальные, носовые, маточные (при воспалительных процессах, фибромиомах) кровотечения, гипоацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенные спастические колиты, метеоризм, заболевания печени и желчевыводящих путей (гепатиты, холециститы, ангиохолиты), заболевания почек и мочевого пузыря (цистит, уретрит, гломерулонефриты, пиелонефрит) - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к другим растениям семейства астровых (Сложноцветные).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не установлена.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано (повышает тонус матки).

### **Способ применения и дозы**

1,5 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде 2-3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{2}$  стакана, детям 12-14 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Препарат применять детям старше 12 лет по назначению врача.

### **Передозировка**

Возможны аллергические реакции (гиперемия, сыпь), головокружение, тошнота.

### **Побочные реакции**

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Лектравы».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.