

Состав

действующие вещества: 1 г сбора содержит черники обыкновенной побегов (*Vaccinii myrtilli cormus*) 0,2 г, фасоли обыкновенной створок плодов (*Phaseoli valvae fructum*) 0,2 г, элеутерококка колючего корневищ и корней (*Eleutherococci senticosi rhizomata et radices*) 0,15 г, шиповника плодов (*Rosae fructus*) 0,15 г, хвоща полевого травы (*Equiseti arvensis herba*) 0,1 г, зверобоя травы (*Hyperici herba*) 0,1 г, ромашки цветков (*Matricariae flores*) 0,1 г.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета со светло-желтыми, серовато-бурыми, кремовыми, желтовато-серыми, оранжево-красными, буровато-красными, бурыми и белыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Противодиабетические препараты. Код АТХ А10Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают гипогликемическое действие при сахарном диабете II типа, что позволяет в некоторых случаях уменьшить суточные дозы пероральных противодиабетических средств; повышают толерантность к углеводам.

Показания

Сахарный диабет II типа легкой и средней тяжести (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.
Артериальная гипертензия, нефриты, нефрозы, нефрозо-нефриты.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В комплексной терапии может способствовать снижению доз пероральных противодиабетических препаратов. Не рекомендуется применение больным, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные - блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, холестеринемични средства (статины), сердечные гликозиды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Во время применения препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

1 десертную ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать настой в теплом виде 2-3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20-30 дней взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ стакана, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке. Перед применением настой взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Через 10-15 суток курс лечения рекомендуется повторить (после консультации с врачом). В течение года провести 3-4 курса.

Дети

Препарат применять детям от 3 лет по назначению врача.

Передозировка

Несоблюдение рекомендуемых доз и длительное применение вызывает ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции изжога; повышение артериального давления; фотосенсибилизация (во время лечения следует избегать УФ-излучения) раздражение тканей почек, проявляется болью в пояснице и в конце мочеиспускания.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.