

Состав

действующее вещество: березовые почки;

1 пачка содержит березовых почек 50 г.

Лекарственная форма

Почки.

Основные физико-химические свойства: почки удлинено-конические, заостренные или притупленные, часто клейкие. Цвет почек коричневый, у основания иногда зеленоватый.

Фармакотерапевтическая группа

Нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностью. Код АТХ С03В Х.

Фармакодинамика

Березовые почки содержат эфирное масло, сапонины, флавоноиды (апигенин, изорамнетин), дубильные вещества, смолы, аскорбиновую и никотиновую кислоты, каротин и гиперозид. Настой из березовых почек оказывает мочегонное, желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное, антисептическое, ранозаживляющее, отхаркивающее, противовирусное и противопаразитарное действие.

Показания

Хронические воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря; мочекаменная болезнь; отеки сердечного происхождения; заболевания печени и желчевыводящих путей с нарушением желчеотделения; ларингиты, бронхиты, трахеиты.

Противопоказания

Почечная недостаточность, острые воспалительные заболевания почек, гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата, наличие в анамнезе кровотечений из органов малого таза, анемия, эпилепсия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не назначать в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку почек поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 15 минут. Охладить при комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по $\frac{1}{3}$ стакана 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды. Дети 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана в возрасте от 14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды. Перед употреблением настоя рекомендуется взболтать.

Приготовленный настой хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Не назначать детям до 12 лет.

Передозировка

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Побочные реакции

Диарея. Возможны проявления раздражающего действия настоя на ткань почек, аллергические реакции, включая зуд, высыпания на коже, аллергический ринит, крапивница, гиперемия и отек кожи. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.