

## **Состав**

*действующее вещество:* кукурузы рыльца.

## **Лекарственная форма**

Рыльца резаные-прессованные.

Кусочки цилиндрической формы, диаметром 5 мм, длиной 8-12 мм. Поверхность гладкая, блестящая, изредка матовая, мраморная, на торцах неровная. Цвет от светло- до темно-коричневого. Запах слабый, своеобразный; вкус с ощущением слизистой.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства применяемые при билиарной патологии. Код АТС А05А Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают желчегонное, диуретическое (увеличивают на 150-160% отток мочи), кровоостанавливающим и гипогликемическое действие; увеличивают секрецию желчи, уменьшают ее вязкость, снижают содержание билирубина, повышают содержание протромбина в крови и ускоряют ее свертывания, способствуют выведению с мочой уратов, оксалатов, фосфатов.

## **Показания**

Холециститы, холангиты, гепатиты с нарушением желчеотделение; циститы, мочекаменная болезнь, отеки геморрагические диатезы, кровотечения, вызванные снижением уровня протромбина (в составе комплексной терапии).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществ препарата. Повышенная свертываемость крови, увеличен протромбиновый индекс, тромбофлебит, желчекаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, обтурационная желтуха, анорексия.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

### **Способ применения и дозы**

1 десертную ложку столбиков с рыльцами поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде каждые 3-4 часа взрослым и детям старше 14 лет - по 1-3 столовые ложки; детям 10-14 лет - по 1 столовой ложке, 7-10 лет - по 1 десертной ложке, 3-7 лет - по 1 чайной ложке. Перед применением настой взболтать. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Препарат применяют детям старше 3 лет.

### **Передозировка**

Сообщение отсутствуют.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (в т.ч. покраснение, сыпь, ринит).

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой - при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

### **Упаковка**

По 100 г в пачках с внутренним пакетом.

**Производитель**

ЗАО "Лектравы".

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.