

## **Состав**

*действующее вещество:* лапчатки прямостоячей корневища.

## **Лекарственная форма**

Корневища.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки корневищ различной формы от темно-красного до коричневатого-желтого цвета с красновато-коричневыми и коричневыми включениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Код АТХ А16А Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают вяжущее, бактерицидное, противовоспалительное и кровоостанавливающее действие, снижают проницаемость капилляров, сужают кровеносные сосуды.

## **Показания**

Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, диспепсия, энтерит, энтероколит); желудочные, кишечные и маточные (при воспалительных процессах) кровотечения. Наружно - при воспалительных заболеваниях ротовой полости и горла.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Запоры.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Интервал между приемом препарата и применением других лекарственных средств должен составлять не менее 1 часа.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не установлена.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

1 столовую ложку измельченных корневищ поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане в течение 30 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде за 30-40 мин до еды: взрослым - по 1 столовой ложке 3-5 раз в сутки. Курс лечения - 2-4 недели.

Внешне применять взрослым и детям в виде полосканий.

## **Дети**

Препарат применять детям только наружно - при воспалительных заболеваниях ротовой полости и горла.

## **Передозировка**

Возможна боль в желудке, при возникновении которого необходимо отменить препарат.

## **Побочные реакции**

Возможно развитие реакций гиперчувствительности. Возможно раздражение слизистой оболочки. При приеме внутрь возможны боли в желудке, тошнота, рвота. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

**Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.