

Состав

действующие вещества: 1 г сбора содержит крушины коры (*Frangulae Cortex*) 0,5 г крапивы листья (*Urticae folia*) 0,333 г тысячелистника травы (*Millefolii herba*) 0,167 г.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков листьев, стеблей, коры темно-зеленого, серо-бурого, темно-бурого цвета с беловатыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительные средства. Код АТХ А06А Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества сбора оказывают мягкое слабительное действие за счет усиления перистальтики кишечника.

Показания

Хронические запоры.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к другим растениям семейства астровых (сложноцветные). Хронические заболевания желудка и кишечника (гастрит, гастроэнтерит, колит) в период обострения, кишечные кровотечения и непроходимость, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, синдром «острого» живота, аппендицит, воспалительные процессы в брюшной полости, острые лихорадочные состояния, повышенная свертываемость крови, артериальная гипертензия, кровотечения, вызванные кистой, полипами и опухолями матки и ее придатков, склонность к тромбообразованию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

2 десертные ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 12 лет.

Передозировка

При передозировке возможны коликообразная боль в животе, тенезмы, ощущение дискомфорта, головокружение, тошнота. При возникновении указанных симптомов следует отменить препарат. Лечение - симптоматическое.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции при гиперчувствительности к препарату (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При длительном применении могут развиваться: коликообразная боль, тошнота, рвота, боль в области желудка, диарея с метаболическими нарушениями, дегидратация, снижение функции ферментов кишечника, атония толстого кишечника.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.