

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 г сбора содержит ромашки цветков (Matricariae flores) 200 мг, грязи обычного побегов (Ledi palustris cormus) 200 мг, календулы цветков (Calendulae flores) 200 мг, фиалки травы (Violae herba) 200 мг, солодки корней (Glycyrrhizae radices ) 150 мг, мяты перечной листья (Menthae piperitae folia) 50 мг.

## **Лекарственная форма**

Сбор.

*Основные физико-химические свойства:* порошок крупный: смесь неоднородных кусочков коричневато-желтого цвета с зелеными, белыми, желто-оранжевыми и коричневыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код ATX R05C A10.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обволакивающее действие, усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют разжижению и отхождению мокроты, смягчают и уменьшают кашель.

## **Показания**

В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (в том числе бронхита, трахеита), связанных с нарушениями бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату или к салицилатам.

Гломерулонефрит, гепатит, спазмофилия, круп, бронхиальная астма.

Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), нарушение функции печени и почек.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении может усиливать эффект снотворных средств и средств, угнетающих ЦНС. Не следует применять вместе с препаратами, угнетающими кашель. Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикоидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.

## **Особенности применения**

У пациентов с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) возможно усиление изжоги.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не изучена.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

2 столовые ложки препарата поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженного отвара. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде до еды в течение 2-3 недель: взрослым и детям старше 12 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1-2 столовые ложки 3 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 5 лет - по 2-3 чайные ложки 3 раза в сутки.

Перед применением настой взболтать.

## **Дети**

Препарат применяют детям в возрасте от 3 лет.

## **Передозировка**

Передозировка и длительное применение (более 2 месяцев) может привести к нарушению водно-электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиемический миопатии и миоглобинурии, возникновение тошноты, рвоты, диареи, аллергических высыпаний на коже. Возможно усиление побочных эффектов.

## **Побочные реакции**

Повышение артериального давления. Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, контактный дерматит, тошнота, рвота, диарея). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЗАО «Лектравы».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.