

Состав

действующее вещество: ортосифона тычиночного листьев (*Orthosiphonis staminei folia*);

1 фильтр-пакет содержит ортосифона тычиночного листьев (*Orthosiphonis staminei folia*) 1,5 г.

Лекарственная форма

Листья.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев и стеблей различной формы зеленого, серовато-зеленого, зеленовато-коричневого, фиолетово-бурого или фиолетово-коричневого цвета с вкраплениями желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Растительные средства с диуретическим эффектом. Код АТХ C03B X.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества листьев оказывают диуретическое, спазмолитическое и желчегонное действие; повышают секрецию желудочного сока, увеличивают в нем содержание свободной соляной кислоты, выводят из организма мочевину, мочевую кислоту, хлориды.

Показания

Острые и хронические заболевания почек, холециститы; отеки, вызванные нарушением функции почек или сердечной недостаточностью (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2 раза в день за 20-30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{2}$ стакана, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, 7-12 лет - по 1 столовой ложке 3 -7 лет - по 1 десертной ложке. При холециститах применять после еды.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8-15 °C не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

При передозировке возможны боли в области почек, печени, желудка.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врач

Срок годности

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 1,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.