

## **Состав**

*действующее вещество:* ортосифона тычиночного листьев (*Orthosiphonis staminei folia*);

1 фильтр-пакет содержит ортосифона тычиночного листьев (*Orthosiphonis staminei folia*) 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Листья.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки листьев и стеблей различной формы зеленого, серовато-зеленого, зеленовато-коричневого, фиолетово-бурого или фиолетово-коричневого цвета с вкраплениями желтовато-белого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Растительные средства с диуретическим эффектом. Код АТХ С03В Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества листьев оказывают диуретическое, спазмолитическое и желчегонное действие; повышают секрецию желудочного сока, увеличивают в нем содержание свободной соляной кислоты, выводят из организма мочевину, мочевую кислоту, хлориды.

## **Показания**

Острые и хронические заболевания почек, холециститы; отеки, вызванные нарушением функции почек или сердечной недостаточностью (в составе комплексной терапии).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

По назначению врача, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

### **Способ применения и дозы**

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2 раза в день за 20-30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по ½ стакана, детям 12-14 лет - по ⅓ стакана, 7-12 лет - по 1 столовой ложке 3 -7 лет - по 1 десертной ложке. При холециститах применять после еды.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

### **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

### **Передозировка**

При передозировке возможны боли в области почек, печени, желудка.

### **Побочные реакции**

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врач

### **Срок годности**

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 1,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Лектравы».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.