Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит масла сосны горной (Oleum Pini pumilionis) 35 мг, масла мяты (Mentha oil) 10 мг, масла эвкалиптового (Eucalypti oleum) 5 мг α-токоферола ацетата 15 мг, тимола 0,3 мг;

вспомогательные вещества: триглицериды средней цепи.

Лекарственная форма

Капли назальные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или со слегка желтоватым оттенком маслянистая жидкость со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Деконгестанты и другие препараты для местного применения в полости носа. Средства, применяемые при заболеваниях полости носа. Комбинированные препараты.

Koд ATX R01A X30.

Фармакодинамика

Пиновит® оказывает противовоспалительное и противоотечное действия, уменьшает выраженность местных экссудативных реакций, уменьшает вязкость секрета слизистой оболочки дыхательных путей. Препарат проявляет антибактериальное действие в отношении некоторых штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также противогрибковое действие в отношении дрожжевых и плесневых грибов.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Острые и хронические риниты неаллергической этиологии, ринофарингиты, инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки носа и носоглотки, ларинготрахеиты.

Противопоказания

Аллергические риниты, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описаны.

Особенности применения

Перед применением необходимо проверить индивидуальную реакцию пациента на препарат после однократного закапывания Пиновиту® в нос. При развитии аллергических реакций препарат нельзя применять.

С осторожностью применять препарат пациентам с заболеваниями печени тяжелой степени.

Не допускать попадания препарата в глаза!

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и работать с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат в терапевтических дозах можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Непосредственно перед применением следует подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы нагреть его до температуры тела. Крышку снять и, слегка нажимая на резиновую вставку-капельницу, закапать раствор в нос. После применения препарата флакон всегда закрывать крышкой.

Взрослые. В первый день закапывать Пиновит® по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в сутки, со второго дня - по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки.

Дети в возрасте от 2 лет. По 1-2 капли препарата 3-4 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от терапевтического эффекта и переносимости препарата. Обычно курс лечения составляет 5-7 дней.

Дети

Пиновит® применять детям в возрасте от 2 лет.

С осторожностью применять детям в связи с возможностью возникновения бронхоспазма.

Передозировка

При местном применении опасность передозировки отсутствует.

Побочные реакции

Ниже в таблице сведены побочные реакции на масло сосны горной, масло мяты, масло эвкалиптовое, α -токоферола ацетат и тимол, сгруппированные в соответствии с терминологии MedDRA и частоты: очень часто ($\geq 1/10$); часто (от $\geq 1/100$ до <1/10); нечасто (от $\geq 1/1000$ до <1/100); редко (от $\geq 1/10000$ до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (не может быть оценена по доступным данным):

| Система органов | Частота | Побочные реакции |
|--|---------|--|
| Со стороны респираторной системы, грудной клетки и средостения | Редко | зуд в носу, жжение в носу, отек слизистой оболочки носовой полости, бронхоспазм, при длительном применении возможна сухость слизистых оболочек органов дыхания |

| Со стороны иммунной системы | | реакции гиперчувствительности, включая сыпь, покраснение, ангионевротический отек, крапивницу |
|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Со стороны органов зрения | частота неизвестна | раздражение глаз |
| Со стороны | | |
| кожи и | частота | раздражение кожи, |
| соединительной | неизвестна | контактный дерматит |
| ткани | | |

Сообщение о возможных побочных реакциях

Сообщение о возможных побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза / риск» для данного лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемые нежелательные реакции через национальную систему сообщений.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Фармак».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.