

Состав

действующие вещества: цинка сульфата гептагидрат, кислота борная;

1 мл препарата содержит цинка сульфата гептагидрата 2,5 мг, кислоты борной 20 мг;

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли глазные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии. Противомикробные препараты. Соединения цинка. Код АТХ S01A X03.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает антимикробное действие при местном применении в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе синегнойной палочки.

Препарат хорошо проникает сквозь конъюнктивальную оболочку, особенно у детей.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Конъюнктивиты бактериальной этиологии.

Противопоказания

Применение противопоказано при повышенной чувствительности к компонентам препарата, при нарушении функции почек, печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Особенности применения

Не допускать длительного применения препарата и превышению рекомендуемых доз, особенно у детей с 12 лет.

При длительном применении препарата (более одного месяца) могут возникать симптомы хронической интоксикации: местный отек тканей, головокружение, стоматит, экзема, нарушение менструального цикла у женщин, анемия, миалгия, судороги, лихорадка, нарушение функции почек, электролитный дисбаланс, дегидратация.

В этих случаях препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.

В случае случайного употребления внутрь возможные симптомы острого отравления: тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение центральной нервной системы, снижение температуры тела, нарушение дыхания, эритематозная сыпь. При этом проводят зондовое промывание желудка, назначают внутрь солевые слабительные средства, энтеросорбенты (активированный уголь), симптоматическую терапию. В случае тяжелого отравления принимают меры по поддержанию жизненно важных функций организма, проводят гемодиализ или перитонеальный диализ.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение лекарственного средства в период беременности противопоказано.

В случае необходимости лечения препаратом кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет закапывать пипеткой по 2 капли препарата 2–3 раза в день в каждый глаз. Курс лечения 1–3 недели.

Дети

Не применять детям до 12 лет.

Передозировка

При частом применении препарата (чаще 3 раз в сутки в течение курса лечения) возможно передозировка, сопровождающееся симптомами хронической интоксикации. Показана отмена препарата, симптоматическая терапия.

Побочные реакции

При местном применении возможны местные аллергические реакции, покраснение, зуд, отек век, раздражение и боль в глазу.

При длительном или частом применении могут наблюдаться явления общерезорбтивного действия, при системных реакциях отмечается тошнота, рвота, диарея, дегидратация, кожная сыпь, боль в мышцах, головная боль, возможно нарушение функции почек, печени, особенно в детском возрасте.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

2 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл во флаконах.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).