

Состав

действующее вещество: taurine;

1 мл раствора содержит таурина 40 мг;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксibenзоат (Е 218), вода для инъекций.

Лекарственная форма

Капли глазные, раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии. Другие офтальмологические средства.

Код АТХ S01X A.

Фармакодинамика

Тауфон-Дарница содержит таурин – серосодержащую аминокислоту, которая образуется в организме в процессе превращения цистеина. Таурин участвует в синтезе пластического материала, в результате чего стимулирует репаративные и регенеративные процессы при заболеваниях глаз дистрофического характера и/или патологических процессов, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей, в том числе – при травмах глаз. Способствует нормализации функций клеточных мембран, оптимизации энергетических и обменных процессов, поддержанию постоянства электролитного состава цитоплазмы клеток, торможению синаптической передачи.

Фармакокинетика

При закапывании лекарственное средство проникает в ткани глаза, где и оказывает свое специфическое действие. При применении в терапевтических дозах лекарственное средство практически не всасывается в системный кровоток.

Показания

- Дистрофические поражения роговицы и сетчатки глаза, включая наследственные тапеторетинальные дегенерации;
- катаракты (возрастные, диабетические, травматические, лучевые);
- как средство стимулирования репаративных процессов при травмах роговицы;
- открытоугольная глаукома (как дополнительное средство).

Противопоказания

Гиперчувствительность к таурину или к другим компонентам лекарственного средства

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При совместном применении с глазными каплями тимолола усиливается снижение внутриглазного и артериального давления.

При одновременном назначении нескольких лекарственных средств для местного применения в глаз необходимо вводить их с интервалом 10–15 минут. Глазные мази следует применять последними.

Особенности применения

При открытоугольной глаукоме лекарственное средство применять в сочетании с тимололом за 20–30 минут до закапывания тимолола.

Вспомогательные вещества: лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218), который может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Действие лекарственного средства на организм человека при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами не изучалось.

Как и в случае использования других офтальмологических лекарственных средств для местного применения, временное помутнение зрения или другие нарушения зрения могут влиять на способность управлять автотранспортом или другими механизмами. Если после закапывания возникает нечеткость зрения, пациенту необходимо подождать, пока зрение прояснится, прежде чем управлять автотранспортом или работать с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не исследовались.

Способ применения и дозы

Тауфон назначать взрослым.

Непосредственно перед применением следует подержать тюбик-капельницу с лекарственным средством в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела. Для открытия тюбика-капельницы повернуть крышку до ее полного отделения от корпуса. Слегка надавливая на корпус тюбика-капельницы, закапывать раствор в глаз.

Для лечения катаракты назначать по 2–3 капли 2–4 раза в сутки ежедневно.

Срок лечения – 3 месяца. Курс повторить с интервалом в 1 месяц.

При травмах применять по 2–3 капли 2–4 раза в сутки в течение 1 месяца.

Для лечения тапеторетинальной дегенерации и других дистрофических заболеваний сетчатки, проникающих травм роговицы лекарственное средство вводить под конъюнктиву по 0,3 мл

4 % раствора 1 раз в сутки в течение 10 дней. Курс лечения повторить через 6–8 месяцев.

При открытоугольной глаукоме лекарственное средство закапывать по 2–3 капли в конъюнктивальный мешок 2 раза в день за 20–30 минут до применения тимолола. Курс лечения определяется врачом индивидуально.

Дети

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства детям не исследовались.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Побочные реакции

У отдельных пациентов возможно развитие аллергических реакций, гиперемии конъюнктивы, зуда, жжения и рези в глазах.

Срок годности

2 года.

После вскрытия флакона лекарственное средство хранить не более 28 суток.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).