

## **Состав**

Лактоферрин, гидроксипропил метилцеллюлоза, натрия N-гидроксиметилглицинат, натриевая соль EDTA, гидроксид калия, одноосновной фосфат натрия, двухосновной фосфат натрия, хлорид натрия, вода очищенная.

## **Описание**

Лакто - это офтальмологический раствор, содержащий гипромеллоза, которая смазывает и увлажняет глазную поверхность.

Лакто полезен во всех случаях изменений слезной пленки, вызванных: попаданием солнечных лучей, действием атмосферных агентов, излучением видеоустройств. В систему консервантов входит лактоферрин, вещество обычно присутствует в слезной жидкости, которая, захватывая железо, помогает тормозить рост микробов.

## **Показания**

Лакто показан при лечении сухости глаз и симптомов, связанных с прогрессирующими воспалительными состояниями.

## **Предупреждение**

- Случаи кальцификации роговицы, связанные с применением глазных капель, содержащих фосфаты, встречались очень редко у пациентов очень поврежденной роговицей. В случае лентовидной кератопатии или отложений кальция на роговице, проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием глазных капель.
- Стерильный к открытию.
- Чтобы предотвратить возможное загрязнение, не допускайте контакта кончика капельницы с любой поверхностью или глазом.
- После использования бутылку плотно закройте.
- Не используйте в случае специфической гиперчувствительности к любому из ингредиентов.
- Не используйте, если упаковку поврежден.
- В случае побочных реакций немедленно прекратите лечение и обратитесь к врачу.
- Не глотайте.
- Не используйте по истечении срока годности, указанного на упаковке.

- Необходимо использовать в течение 30 дней после открытия. Выбросьте остатки.
- В случае постоянных проблем проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте постоянно более 30 дней.

### **Способ применения и дозы**

Продолжительность лечения и дозировку должен указать ваш врач-офтальмолог.  
Рекомендуемая дозировка - 1-2 капли в глаз.

1. Вымойте руки.
2. Открутите колпачок.
3. Держите бутылку вверх дном между большим и остальными пальцами.
4. Отведите нижнее веко вниз.
5. Удерживайте кончик бутылки возле глаза, не касаясь глаз или соседних областей.
6. Нанесите рекомендуемое количество капель и осторожно закройте веки, чтобы равномерно распределить продукт на поверхности глаз.
7. Повторите процедуру для другого глаза, если это рекомендует ваш врач-офтальмолог.
8. После применения плотно закройте бутылку, чтобы избежать загрязнения.

### **Условия хранения**

Хранить вдали от источников тепла в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 30 °С.

### **Упаковка**

По 15 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Италдевайс с.р.л. Новакс Фарма, Франция.