

Состав

1 мл содержит:

- Пропиленгликоль - 6,0 мг.
- Гидроксипропилгуар - 0,5 мг.
- Минеральное масло - 10 мг.
- Димиристоил фосфатидилглицерол - 0,05 мг.
- Полиоксил 40 стеарат - 3,8 мг.
- Сорбитан тристеарат - 2,9 мг.
- Кислоту борную - 10,0 мг.
- Србитол - 7,0 мг.
- Динатрия эдетат - 0,25 мг.
- Поликвад[®] (поликватерный-1) - 0,01 мг.
- Кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения рН).
- Воду очищенную - до объема 1 мл.

Лекарственная форма

Капли для глаз. Средство для увлажнения глаз.

Показания

Средство увлажняет поверхность глаза, стабилизирует липидный слой слезной пленки и уменьшает испарение слезной жидкости. Обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особенности применения

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению.

При продолжающемся дискомфорте, слезотечения, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

Не использовать раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Способ применения и дозы

Перед применением флакон встряхивать.

Средство офтальмологическое может применяться по мере необходимости на протяжении дня.

Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте.

Средство офтальмологическое может использоваться для устранения симптомов синдрома «сухого глаза», вызванного ношением контактных линз, путем закапывания в каждый глаз до надевания и после снятия контактных линз.

Дети

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18-ти лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

Срок годности

Не используйте раствор более 6-ти месяцев после первого вскрытия флакона.

Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Храните флакон плотно закрытым.

Упаковка

По 10 мл во флаконе, по 1 флакону в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Alcon Laboratories Inc. (США)