

## **Состав**

*действующее вещество:* фенольный гидрофобный препарат прополиса;

1 суппозиторий содержит фенольного гидрофобного препарата прополиса (в пересчете на 50 % содержание суммы фенольных соединений) 0,1 г (100 мг);

*вспомогательные вещества:* диметилсульфоксид, пропиленгликоль, твердый жир.

## **Лекарственная форма**

Суппозитории.

*Основные физико-химические свойства:* суппозитории от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, пулеобразной формы, со специфическим запахом. Допускается наличие налета и неоднородность окрашивания в виде вкраплений и мраморности.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.  
Код АТХ С05А Х.

## **Фармакодинамика**

Фенольный гидрофобный препарат прополиса обеспечивает противовоспалительное, репаративное и антимикробное действие. Присутствие димексида в составе суппозитория дополняет спектр активности препарата обезболивающими свойствами, повышает резорбцию фармакологических веществ через слизистую оболочку.

Пропиленгликоль и основа создают условия для реализации терапевтических эффектов действующих веществ суппозитория.

## **Фармакокинетика**

Нет данных.

## **Показания**

Проктиты, анальные трещины, послеоперационные раны дистального отдела прямой кишки.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергические реакции на продукты пчеловодства.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Можно применять в комбинации с другими препаратами, предназначенными для лечения сопутствующих заболеваний. Не рекомендовано одновременное применение с другими продуктами пчеловодства.

## **Особенности применения**

Перед применением суппозитория необходимо:

- по линии перфорации блистерной упаковки оторвать один суппозиторий в первичной упаковке;
- далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить суппозиторий от первичной упаковки.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Каких-либо данных о влиянии препарата на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами нет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности или кормления грудью применение препарата возможно по назначению врача в случае, если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 7 лет – по 1 суппозиторию 3 раза в сутки после опорожнения кишечника. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от тяжести заболевания. Курс лечения может составлять от 8-10 дней до 14-21 дня.

### **Дети**

Препарат не применяется для лечения детей младше 7 лет.

### **Передозировка**

Не установлена.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 5 суппозитория в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).