

## **Состав**

*действующие вещества:* бензокаин, висмута субгаллат, цинка оксид, ментол;

1 суппозиторий содержит бензокаина (0,1 г) 100 мг, висмута субгаллата (0,04 г) 40 мг, цинка оксида (0,02 г) 20 мг, ментола (0,004 г) 4 мг;

*вспомогательные вещества:* полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.

## **Лекарственная форма**

Суппозитории.

*Основные физико-химические свойства:* суппозитории зеленовато-желтого цвета, пулеобразной формы.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Местноанестезирующие средства. Код АТХ С05А D.

## **Фармакодинамика**

Анестезол® – комплексное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в его состав. Анестезол® оказывает местноанестезирующее, противовоспалительное и вяжущее действие.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Симптоматическая терапия геморроя и трещин заднего прохода.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к другим амидным анестетикам.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не изучалось.

### **Особенности применения**

При длительном применении препарата необходим контроль показателей крови.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

При лечении препаратом рекомендуется воздерживаться от управления транспортными средствами и выполнения работ, требующих повышенного внимания и точной координации.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Женщинам в период беременности или кормления грудью препарат назначает врач, учитывая соотношение риск/польза.

### **Способ применения и дозы**

Перед применением суппозитория необходимо:

1. по линии перфорации блистерной упаковки оторвать один суппозиторий в первичной упаковке;
2. далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить суппозиторий от первичной упаковки.

Препарат применяют ректально. По 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки после очистительной клизмы кишечника или самостоятельной дефекации.

Продолжительность лечения определяет врач, учитывая течение и тяжесть заболевания, достигнутый терапевтический эффект.

### **Дети**

Данных о применении препарата детям нет.

### **Передозировка**

При применении в терапевтических дозах передозировка маловероятна. Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое.

### **Побочные реакции**

Иногда возникают аллергические реакции, кожная сыпь, зуд. Препарат может оказывать слабительное действие, вызывать жжение в заднем проходе. При длительном применении могут развиваться реакции со стороны крови (метгемоглобинемия).

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 5 суппозитория в блистере, по 1 блистеру в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).