

## **Состав**

*действующие вещества:* phenazone, lidocaine;

1 г препарата содержит феназона 40 мг, лидокаина гидрохлорида 10 мг;

*вспомогательные вещества:* этанол 96%, глицерин, натрия тиосульфат, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Капли ушные, раствор.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная раствор от бесцветного до желтоватого цвета со спиртовым запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в отологии. Код АТХ S02D A30.

## **Фармакодинамика**

Препарат представляет собой комбинацию двух активных ингредиентов: феназона и лидокаина.

*Феназон:* производное пиразолона с анальгетическими и противовоспалительными свойствами.

*Лидокаин:* местный анестетик амидной группы. Комбинация феназона с лидокаином обуславливает синергический обезболивающий / противовоспалительный эффект.

## **Фармакокинетика**

Резорбцию компонентам препарата через кожу не изучали. Резорбция почти отсутствует.

Системное всасывание активных компонентов не предвидится (при отсутствии повреждений барабанной перепонки).

Действие препарата (уменьшение болезненности барабанной перепонки и редукция воспаления) начинается с 5-й минуты после закапывания. Болевой синдром почти полностью исчезает через 15-30 минут.

## **Показания**

Местное симптоматическое лечение определенных болевых состояний среднего уха с интактной барабанной перепонкой в возрасте от 1 месяца и взрослых при:

- Среднем отите в остром периоде;
- Фликтенульозном вирусном отите (послегриппозных);
- Баротравматическом отите.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующим веществам, любых компонентов препарата или к амидных местноанестезирующих лекарственных средств. Перфорация барабанной перепонки травматического или инфекционного происхождения.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

В настоящее время нет данных о возможности возникновения клинически значимых взаимодействий.

## **Особенности применения**

Перед любым применением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки (как мера пресечения). Если есть деструкция барабанной перепонки, введение препарата в ухо может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, вызывая побочные реакции в этих тканях.

Следует учитывать, что препарат содержит активный компонент, который может показать положительный результат в антидопинговом тесте.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или работать с потенциально опасными механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не предвидится последствий применения препарата в период беременности, поскольку системная экспозиция феназона и лидокаина незначительно.

При нормальных условиях применения феназон и лидокаин не проникают в грудное молоко. При необходимости препарат можно применять в период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Детям в возрасте от 1 месяца и взрослым закапывать 2-3 раза в сутки по 4 капли в наружный слуховой проход уха, в котором ощущается боль. Курс лечения не должен превышать 10 дней. После чего нужен пересмотр лечения.

Способ применения: для применения в ухо.

Для того, чтобы предотвратить неприятные ощущения в результате контакта кожи слухового прохода с холодным раствором, следует согреть флакон в руке перед применением лекарственного средства. Затем открутить крышку с флакона, закапать 4 капли с помощью капельницы. После применения навинтить капельницу на флакон и вложить флакон в упаковку.

### **Дети**

Нет данных по безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте до 1 месяца. Применять детям в возрасте от 1 месяца после консультации и по рекомендации врача.

### **Передозировка**

При применении препарата в рекомендуемой дозировке передозировки не наблюдалось.

### **Побочные реакции**

*Со стороны органов слуха и равновесия:* местные реакции: аллергические реакции, включая раздражение, гиперемию наружного слухового прохода, зуд, кожные высыпания.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Срок годности после вскрытия флакона не более 4 недель.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 16 г во флаконе с крышкой-капельницей со стеклянной пипеткой в коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания«  
Здоровье ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61013, Харьковская обл., Город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).