Состав

действующие вещества: декспантенол (D-пантенол), хлоргексидина биглюконат;

1 суппозиторий содержит декспантенола (D-пантенола) в пересчете на 100% вещество 0,1 г хлоргексидина биглюконата 0,016 г;

вспомогательные вещества: макрогол 1500, макрогол 400.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории шарообразной формы белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета. Допускается мраморность поверхности.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии.
Код АТХ G01A X

Фармакодинамика

Депантол® - комбинированный препарат для местного применения, оказывает регенерирующее, антисептическое, метаболическое действие. Хлоргексидин, который входит в состав препарата, активных грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Chlamidia spp.*, Дрожжи, дерматофиты, простейшие (*Trichomonas vaginalis*). К препарату слабо чувствительными являются некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, А также кислотостойкие формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.

Декспантенол стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, витаминизирующее и противовоспалительное действие.

Депантол® не затрагивает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) при наличии крови, гноя.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Лечение острых и хронических вагинитов, эндо/экзоцервицитов, в том числе осложненных эктопией шейки матки.

Лечение истинных эрозий шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии).

Препарат применяют для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктивных методов лечения (диатермокоагуляция, криодеструкция, лазеродеструкция), в послеоперационном, послеродовом периодах.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат совместим с детергентами, которые содержат анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Особенности применения

Попадание гипохлоритных отбеливающих веществ на ткани, ранее находились в контакте с препаратом, который содержит хлоргексидин, может способствовать появлению коричневых пятен на ткани.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение не противопоказано во всех триместрах беременности и в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от блистера. Применяют взрослым по 1 свече 2 раза в сутки в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней. Применение препарата возможно во время менструации, однако курс лечения целесообразно начинать после ее окончания или ближе к ее завершению (после уменьшения количества выделений).

Дети

Опыта применения у детей нет.

Передозировка

Данных о случаях передозировки нет. При применении согласно инструкции передозировки маловероятно.

Побочные реакции

В отдельных случаях при повышенной индивидуальной чувствительности возможны аллергические реакции, включая зуд, жжение, отек, кровянистые выделения, недомогание, которые проходят после отмены препарата.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20 ° С.

Упаковка

По 5 суппозитория в блистере, по 2 блистера в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).