

## **Состав**

10 г содержит: масло сосны обыкновенной - 685 мг, масло эвкалиптовое - 432.5 мг, α-токоферола ацетат - 288.5 мг, тимол - 21.75 мг, левоментол - 72.25 мг;

*вспомогательные вещества:* вазелин белый, воск белый, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-CS), бутилгидроксианизол.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

Мазь назальная белого цвета, прозрачная, с запахом эфирных масел.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике.

Деконгестанты и другие препараты для местного применения. Код АТХ R01A.

## **Фармакодинамика**

Противоконгестивное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным и антисептическим действием.

## **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

## **Показания**

- Острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся высыханием слизистых оболочек носа;
- состояния после операций в полости носа и тампонады носа (в условиях стационара и амбулаторно).

## **Противопоказания**

- Аллергический ринит;

- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Лекарственное взаимодействие препарата Пиносол® не описано.

## **Особенности применения**

Необходимо избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз.

При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, пациенту необходимо обратиться к врачу.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

При применении препарата способность к концентрации внимания не снижается.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Возможно применение мази назальной Пиносол® при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Способ применения и дозы**

### *Режим дозирования*

Взрослым и детям старше 2 лет препарат наносят в количестве приблизительно 0.5 см в каждый носовой ход на поверхность слизистой оболочки передних отделов носовой полости. Для введения можно использовать ватный тампон (палочку, обернутую в конце комочком ваты). Затем умеренным надавливанием на крылья носа растирают мазь по слизистой оболочке носа.

Процедуру повторяют 3-4 раза/сут. Длительность лечения составляет 7-14 дней. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

## **Дети**

Препарат назначают детям старше 2 лет.

## **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

## **Побочные реакции**

*Местные реакции:* зуд, жжение, покраснение или отек слизистой оболочки носовой полости.

*Прочие:* аллергические реакции.

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

## **Упаковка**

Туба 10 г в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

АО «Санек Фармасьютикалз».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Нитрянська 100, 920 27 Глоговец, Словацкая Республика.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).