

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит глюкозы моногидрата 1 г;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат, кислота стеариновая.

Лекарственная форма

Таблетки.

Таблетки круглой формы с плоской поверхностью со скошенными краями и чертой, белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.
Код АТС А16АХ.

Фармакодинамика

Глюкоза принимает участие в энергетическом и углеводном обмене, обеспечивает пополнение энергозатрат, улучшает антитоксическую функцию печени, увеличивает сократительную деятельность сердечной мышцы и диурез.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани; продукты его обмена выводятся с мочой.

Показания

Гипогликемия. Восполнение легкоусвояемых углеводов при физических и умственных нагрузках.

Противопоказания

Сахарный диабет и различные состояния, сопровождающиеся гипергликемией. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Нет данных.

Особенности применения

Препарат не рекомендуют назначать больным с пониженной толерантностью к глюкозе.

При длительном применении высоких доз препарата необходим контроль уровня сахара в крови.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью. Необходимо соблюдать дозировку и длительность курса в соответствии с рекомендациями врача.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте от 3 лет: препарат принимают внутрь по 1/2–1 таблетке (0,5–1 г) в сутки.

Дозы и длительность лечения зависят от характера и течения заболевания, эффективности терапии.

Дети

Данные относительно безопасности и эффективности применения препарата детям до 3 лет отсутствуют, поэтому данную лекарственную форму не применяют в этом возрасте.

Передозировка

Симптомы: при однократном применении большого количества препарата наблюдается нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, понос).

Лечение: отмена препарата. Симптоматическая терапия.

Побочные реакции

У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Киевский витаминный завод».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

04073, Украина, г.. Киев, ул. Копылевская, 38.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).