

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 таблетка содержит глюкозы моногидрата 1 г;

*вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат, кислота стеариновая.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

Таблетки круглой формы с плоской поверхностью со скошенными краями и чертой, белого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.  
Код АТС А16АХ.

## **Фармакодинамика**

Глюкоза принимает участие в энергетическом и углеводном обмене, обеспечивает пополнение энергозатрат, улучшает антитоксическую функцию печени, увеличивает сократительную деятельность сердечной мышцы и диурез.

## **Фармакокинетика**

Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани; продукты его обмена выводятся с мочой.

## **Показания**

Гипогликемия. Восполнение легкоусвояемых углеводов при физических и умственных нагрузках.

## **Противопоказания**

Сахарный диабет и различные состояния, сопровождающиеся гипергликемией. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Нет данных.

### **Особенности применения**

Препарат не рекомендуют назначать больным с пониженной толерантностью к глюкозе.

При длительном применении высоких доз препарата необходим контроль уровня сахара в крови.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью. Необходимо соблюдать дозировку и длительность курса в соответствии с рекомендациями врача.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям в возрасте от 3 лет: препарат принимают внутрь по 1/2–1 таблетке (0,5–1 г) в сутки.

Дозы и длительность лечения зависят от характера и течения заболевания, эффективности терапии.

### **Дети**

Данные относительно безопасности и эффективности применения препарата детям до 3 лет отсутствуют, поэтому данную лекарственную форму не применяют в этом возрасте.

### **Передозировка**

*Симптомы:* при однократном применении большого количества препарата наблюдается нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, понос).

*Лечение:* отмена препарата. Симптоматическая терапия.

**Побочные реакции**

У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.

**Срок годности**

4 года.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 10 таблеток в блистерах.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ПАО «Киевский витаминный завод».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

04073, Украина, г.. Киев, ул. Копылевская, 38.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).