

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Cinnabaris D3 25 мг, Echinacea D1;

1 таблетка содержит Cinnabaris D3 25 мг, Echinacea D1 25 мг, Hydrastis D3 25 мг, Kalium bichromicum D3 25 мг;

вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: белые или почти белые, иногда с отдельными темными точками двухплоскостных таблетки со скошенной кромкой.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Циннабсин представляет собой гомеопатический комбинированный препарат. *Cinnabaris* быстро и надежно освобождает от таких характерных симптомов воспаления околоносовых пазух как головные боли, слезотечение, а также от невралгии в области лица. *Hydrastis* и *Kalium bichromicum* действуют главным образом при подостром и хроническом течении заболевания, часто имеет место при длительном синусите. Все три ингредиента способствуют снятию отека слизистых оболочек и восстановлению носового дыхания. *Echinacea* способствует общей поддержке иммунной системы.

Показания

Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа (синусит).

Противопоказания

Не применять детям до 2 лет, в период беременности или при известной гиперчувствительности к хрому, эхинацеи и других разновидностей семейства сложноцветных или к любому из компонентов препарата. Из фундаментальных соображений Циннабсин не следует применять в случаях: прогрессирующие

системные заболевания (такие как туберкулез и саркоидоз), системные заболевания белых кровяных телец (например, лейкомия и лейкоз), аутоиммунные заболевания (например, воспалительные заболевания коллагеновой ткани (коллагенозы), рассеянный склероз), иммунодефициты (в том числе ВИЧ-инфекции), иммуносупрессия (например, после трансплантации органов или костного мозга, или химиотерапии) или хронические вирусные заболевания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Существует риск возможных анафилактических реакций в atopических пациентов. Перед применением данного лекарственного средства atopическим пациентам следует проконсультироваться с врачом.

Необходимо проконсультироваться с врачом:

- если наблюдается отек лица, лихорадка или сильная головная боль,
- если острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых двух дней лечения,
- если появляются дополнительные жалобы.

Препарат содержит крахмал пшеничный, поэтому пациентам с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена не следует принимать этот препарат.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не следует применять препарат в период беременности из-за содержания эхинацеи. Если пациентка кормит грудью, следует проконсультироваться с врачом перед применением данного лекарственного средства.

Способ применения и дозы

Детям в возрасте от 2 до 5 лет: при острых состояниях - по 1 таблетке 3 раза в день до улучшения состояния. При дальнейшем лечении продолжать принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки;

детям в возрасте от 6 до 11 лет: при острых состояниях - по 1 таблетке каждые 2 часа (но не более 6 таблеток в сутки) до улучшения состояния. При дальнейшем лечении принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки;

взрослым и детям старше 12 лет: при острых состояниях - по 1 таблетке каждый час (но не более 12 таблеток в сутки) до улучшения состояния. При дальнейшем лечении принимать по 1-2 таблетки 3 раза в сутки.

При хронических состояниях детям и взрослым - по 1 таблетке 3 раза в сутки, рекомендуемая продолжительность лечения - 4-6 недель.

Циннабсин не рекомендуется принимать более 4 недели без консультации с врачом.

Таблетки принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Детям до 3-х лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Дети

Препарат назначать детям в возрасте от 2 лет.

Передозировка

В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

Побочные реакции

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, желудочно-кишечные расстройства, включая тошноту, рвоту и диарею. У

больных, получавших другие препараты, содержащие эхинацею, отмечались аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, в отдельных случаях - отек лица, одышка, головокружение и снижение артериального давления). Эхинацея может стать причиной возникновения аллергических реакций в atopических пациентов (например, у пациентов с сенной лихорадкой, нейродерматите, аллергической астмой).

В случае усиления слюноотделения после приема препарата Циннабсин рекомендуется уменьшить дозу или прекратить прием препарата.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 5 блистеров в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ / Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

или

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ / Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оттоштрассе 24 76227 Карлсруэ, Германия / Ottostrasse 24 76227 Karlsruhe, Germany.

или

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия / Steinenfeld, 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).