

Состав

В состав таблетки входят такие витамины и вещества:

- витамин С (аскорбиновая кислота в форме кальция аскорбата) - 110 мг.
- витамин РР (никотинамид) - 15 мг.
- витамин Е (в форме α-токоферола ацетата) - 13 мг.
- витамин В5 (пантотеновая кислота в форме кальция пантотената) - 6 мг.
- витамин В6 (пиридоксин в форме пиридоксина гидрохлорида) - 1,9 мг.
- витамин В2 (рибофлавин) - 1,6 мг.
- витамин В1 (тиамин в форме тиамин нитрата) - 1,2 мг.
- фолаты (в т.ч. фолиевая кислота — 200 мкг, L-метилфолат — 208 мкг, что эквивалентно 200 мкг фолиевой кислоты) - 400 мкг.
- йод - 150 мкг.
- биотин - 60 мкг.
- витамин В12 (цианокобаламин) - 3,5 мкг.

В состав мягкой капсулы входят:

- докозагексаеновая кислота (ДГК) - 200 мг (эквивалентно 500 мг концентрированного рыбьего жира).
- витамин Е (в форме α-токоферола ацетата) - 12 мг.

Свойства

Активные компоненты в диетической добавки Фемибион Наталкер II распределены между двумя лекарственными формами: таблетки и мягкие капсулы. Каждая таблетка содержит в себе фолиевую кислоту, метафолин, 9 жизненно необходимых витаминов и йод. Каждая мягкая капсула содержит в себе эссенциальную омега-3 жирную кислоту — ДГК и витамин Е.

Фолиевая кислота - жизненно важный витамин для будущих и кормящих матерей. Огромное количество проведенных исследований показывают положительное влияние фолиевой кислоты и натуральных пищевых фолатов на течение беременности и нормальное развитие ребенка.

С пищей поступает, как правило, недостаточное количество фолатов, не обеспечивающее суточную потребность женщины детородного возраста, а у беременных потребность в фолатах повышена. Поэтому очень важен дополнительный прием фолиевой кислоты в виде вот таких добавок. В организме фолиевая кислота преобразуется в биологически активную форму.

Метафолин - легко усваиваемая биологически активная форма фолатов. Благодаря этому Метафолин более доступен для организма и лучше усваивается, чем фолиевая кислота.

Показания

Фемибион Наталкер II предназначена для женщин, начиная с 13-й нед беременности и до конца периода грудного вскармливания.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Фемибион Наталкер II рекомендуется принимать по 1 таблетке и капсуле в день во время приёма пищи, запивая небольшим количеством воды. Предпочтительно принимать таблетку и мягкую капсулу одновременно. Последовательность приема не влияет на эффективность продукта.

Срок годности

2 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в сухом недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше 25°C.

Упаковка

По 30 таблеток + 30 капсул в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

P&G HELLS AXIS GmbH, Германия.