

Состав

действующее вещество: экстракт жидкий из корневищ с корнями родиолы розовой (*Rhodiolae radix*);

1 флакон препарата содержит экстракт жидкий из корневищ с корнями родиолы розовой (*Rhodiolae radix*) (1:1) (экстрагент – этанол 40%) 25 мл.

Лекарственная форма

Экстракт редкий.

Основные физико-химические свойства: - жидкость темно-бурого цвета с характерным ароматом.

Фармакотерапевтическая группа

Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.

Фармакодинамика

Экстракт родиолы жидкий относится к группе тонизирующих средств, характеризуется адаптогенными свойствами благодаря содержанию в корневищах с корнями органических кислот, дубильных веществ, бета-ситостерина, двух кристаллических веществ: п-оксифенил-β-этанола п-тирозина и его гликозида п-оксифенил-β-(β-α глюкопиранозида)-этанола родиолизиды.

Препарат повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам (переохлаждение, перегревание, кислородное голодание, разные стрессы), ослабляет психическое напряжение, повышает умственную и физическую работоспособность за счет оптимизации энергетических процессов и стимуляции функций центральной нервной системы. Получены экспериментальные данные об антиаритмическом действии экстракта родиолы жидкого.

Фармакокинетика

Не вивчалась.

Показания

Астенические состояния, повышенная утомляемость, неврастения, вегетососудистая дистония, период реконвалесценции, снижение работоспособности.

Противопоказания

Артериальная гипертензия, лихорадка, повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период кормления грудью, детский возраст (до 18 лет).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат может усиливать влияние ингибиторов моноаминоксидазы и других психостимулирующих средств.

Особенности применения

Родиолы экстракт жидкий не рекомендуют принимать во второй половине дня для предупреждение бессонницы, с осторожностью назначают препарат лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не обнаружено.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Препарат застосовують дорослим внутрішньо по 5-10 крапель 2-3 рази на день за 10 хвилин

до їди. При астенії, у психіатричній практиці призначають спочатку 10 крапель 2-3 рази на день, поступово підвищуючи дозу до 30-40 крапель на прийом.

Тривалість лікування

1-2 місяці.

Дети

Не призначати дітям (віком до 18 років).

Передозировка

На сьогоднішній день інформації о случаях передозировки не поступало.

Возможна чрезмерная возбудимость, при которой рекомендуется отменить препарат.

Побочные реакции

Со стороны центральной нервной системы: повышенная возбудимость, бессонница, головные боли.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД.

Возможны случаи повышенной чувствительности к препарату, при которых необходима десенсибилизирующая терапия.

Лабораторные исследования: гипогликемия.

При появлении нежелательных симптомов следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Упаковка

По 25 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Биолик».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладизин, вул. Незалежності, 131, Ш.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).