

Состав

действующее вещество: 100 мл раствора содержат экстракта жидкого «Вигор» (1 : 1), полученного из смеси лекарственного растительного сырья: корневищ аира тростникового (Rhizomata Calami) – 0,325 г; листья вахты трехлистной (Menyanthidis trifoliatae folium) – 0,065 г; травы тысячелистника обыкновенного (Millefolii herba) – 0,432 г; коры дуба обыкновенного (Quercus cortex) – 0,0325 г; плодов укропа пахучего (Fructus anethi graveolentis) – 0,185 г; корневищ с корнями левзеи сафлороподобной (левзеи) (Rhizomata cum radicibus Leuzeae carthamoides) – 0,03 г; цветков липы сердцелистной (Tiliae flos) – 0,3775 г; листья мяты перечной (Menthae piperitae folium) – 0,135 г; травы полыни горькой (Absinthii herba) – 0,065 г (экстрагент: этанол 70 %), – 30 мл;

вспомогательные вещества: сахар-песок, колер, этанол 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор оральный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость золотисто-коричневого цвета со специфическим запахом. Во время хранения допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Другие средства, влияющие на систему пищеварения и метаболические процессы. Код АТХ А16А.

Фармакодинамика

Бальзам "Вигор" содержит эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды, каротин, органические кислоты, лактоны, фитонциды. Фармакологические свойства лекарственного средства обусловлены действием компонентов, входящих в его состав. Препарат обладает адаптогенным, антистрессовым, антитоксическим, противовоспалительным действием. Улучшает умственную и физическую работоспособность, способствует пищеварению и нормализации функций сердечно-сосудистой системы. Препарат повышает резистентность организма к различным эндо-и экзогенным факторам, гипоксии, активизирует ретикуло-эндотелиальную систему, имеет определенный иммунокорректирующий эффект и антиаллергические свойства.

Фармакокинетика

Не изучали.

Показания

Физические и эмоциональные перегрузки, стрессы, астено-вегетативный синдром (повышенная утомляемость, снижение работоспособности, неврастения, нарушения сна); в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей; период реконвалесценции после тяжелых инфекционных заболеваний; при хронических заболеваниях пищеварительного тракта. Бальзам назначают в качестве профилактического средства лицам, работающим в условиях воздействия химических, лучевых и температурных факторов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любым компонентам лекарственного средства; острые и хронические отравления различными химическими веществами, тяжелые формы ишемической болезни сердца и эссенциальной гипертензии; тяжелые нарушения функций печени и почек; эпилепсия; алкоголизм.

ш: повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию, повышенная чувствительность к другим растениям семейства астровых (сложноцветные).

Мята перечная: бронхиальная астма.

Полынь горькая: повышенная желудочная секреция, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь, рефлюкс-эзофагит, наличие в анамнезе кровотечений из органов малого таза, анемия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении лекарственного средства с нитрофуранами, метронидазолом возможно развитие антабусоподобного эффекта, с пероральными антидиабетическими препаратами, производными сульфаниловой кислоты – развитие гипогликемической комы, с ацетилсалициловой кислотой – повышение риска развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, со снотворными средствами – угнетение дыхательного центра.

В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу. В связи с содержанием сахара препарат с осторожностью назначать больным сахарным диабетом. Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку изжога может увеличиться.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не назначать лицам, деятельность которых требует повышенного внимания; препарат может влиять на способность управлять транспортными средствами или работу со сложными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Бальзам «Вигор» не применять беременным и женщинам в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Бальзам «Вигор» применять взрослым внутрь по 20-30 мл 2-3 раза в сутки, во время еды. Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Средний курс лечения составляет 14 дней, при необходимости можно удлинить до 30 дней (после консультации с врачом).

Повторный курс возможен по назначению врача после перерыва продолжительностью 5-7 дней.

Дети

Бальзам «Вигор» не применять детям.

Передозировка

Симптомы: признаки опьянения, угнетение дыхания, тяжелое отравление, коматозное состояние.

Тысячелистник: головокружение, тошнота.

Полынь горькая: прием в повышенных дозах, особенно длительное, может привести к отравлению – развития судорог, галлюцинаций, потери сознания, при длительном применении возможны атонические запоры.

Мята перечная: нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца.

При длительном применении лекарственного средства в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно повышение артериального давления, головная боль, развитие зависимости от алкоголя.

Лечение: немедленная эвакуация желудочного содержимого-вызвать рвоту и промыть желудок), симптоматическая терапия; в тяжелых случаях – инфузионное введение 40 % раствора глюкозы с тиамин хлоридом, оксигенотерапия, форсированный диурез, искусственная вентиляция легких.

Побочные реакции

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного средства возможны аллергические реакции.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожные высыпания, покраснение кожи, зуд, отек кожи, крапивница. В таких случаях препарат следует отменить.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.

Неврологические расстройства возможны при длительном применении лекарственного средства в дозах, превышающих рекомендуемые: повышение артериального давления, головная боль, развитие зависимости от алкоголя.

Длительное применение может вызвать так называемую полынную эпилепсию; абсинтин, содержащийся в полыни, при длительном употреблении может вызвать атонию кишок; контактный дерматит.

В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.