

Состав

действующее вещество: сухой экстракт корней родиолы розовой (*Rhodiola rosea*)

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит сухого экстракта корней родиолы розовой (*Rhodiola rosea*) (1,5-5: 1) 200 мг (экстрагент: этанол 60% (м / м));

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, гипромеллоза, стеариновая кислота, железа оксид красный (E172), титана диоксид (E 171), антипенные эмульсия: симетикон, метилцеллюлоза, кислота сорбиновая.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые таблетки, покрытые пленочной оболочкой красного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Тонизирующие средства. Код АТХ А13А.

Фармакодинамика

Экстракт родиолы розовой WS® 1375 представляет собой адаптоген, который позволяет организму приспособляться к стрессовым условиям. Он проявляет свои адаптационные свойства, модулируя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, которая играет первостепенную роль в организации реакции организма на стресс. Кроме того, Витанго нормализует уровень и активность нейротрансмиттеров в центральной нервной системе. Тем самым он устраняет вызванное стрессом нарушения аппетита, опорно-двигательной активности и сексуальной функции у животных, а также улучшает выработку клеточной энергии за счет повышения уровня аденозинтрифосфата.

Клинические исследования Витанго показывают клинически значимое облегчение симптомов, связанных со стрессом, таких как физическая и умственная усталость, истощение, раздражительность, ухудшение настроения и способности засереджуватися после 4-8 недель лечения. Клиническое исследование 12 недель лечения выявило способность лекарственного средства увеличивать индивидуальную стрессоустойчивость, и в результате этого

уменьшать риск развития синдрома выгорания. Способность Витанго предотвращать стресса была подтверждена в другом исследовании после 12 недель лечения, которое положительно повлияло на внимание и распределение ментальных ресурсов у лиц, входящих в группы риска симптомов стресса.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Применяется как адаптогенное средство для предотвращения психическим и физическим симптомам стресса и переутомления (утомляемость, неврастения, вегето-сосудистая дистония, раздражительность, напряженность) и для их облегчения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата. Беременность и лактация.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные о взаимодействии отсутствуют.

Особенности применения

Препарат не рекомендуется для применения у пациентов с нарушениями функции печени или почек из-за нехватки соответствующих данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Взрослым следует принимать 1 таблетку дважды (утром и в обед) в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат не рекомендуется применять детям (в возрасте до 18 лет).

Передозировка

Случаев передозировки не выявлено.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности, а также гипогликемия. В случае появления нежелательных симптомов следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 1 или 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Вильмар-Швабе-Штрассе 4, 76227 Карлсруэ, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).