

Состав

Активное вещество: фолиевая кислота - 600 мкг, Витамин В6 - 6 мг, Витамин В12 - 5 мкг, витамин Е - 36 мг, Витамин С - 300 мг.

Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, сахар, стеарат кальция.

Описание

Биологически активная добавка Доппельгерц Актив Фолиевая кислота и Витамины это жизненно необходимый и незаменимый витамин, в котором организм нуждается для поддержания многочисленных процессов обмена веществ.

Показания

Как стимулятор кроветворения:

- при гиперхромных макроцитарных и мегалобластических анемиях, которые вызваны недостаточностью фолиевой кислоты;
- в терапии спру в качестве средства для купирования или уменьшения симптомов заболевания, нормализации эритропоэза;
- лейкопения и анемия, которые развились из-за действия ионизирующего излучения, химических (медикаментозных) веществ;
- анемии после операции резекции желудка или части кишечника;
- мегалобластные анемии из-за туберкулеза кишечника или гастроэнтерита (в т.ч. – для профилактики анемии при этих состояниях);
- пеллагра;
- пернициозная анемия.

С профилактической целью:

- превентивное лечение при беременности и вскармливании грудью.

Противопоказания

Реакции аллергического характера на фолиевую кислоту.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В комбинации с неомицином, хлорамфениколом, тетрациклинами и полимиксином наблюдается уменьшение абсорбции фолиевой кислоты в кишечнике. Фолиевая кислота может снижать эффективность ПАСК, примидона, гормональных пероральных контрацептивов, сульфосалазина, фенитоина, хлормфеникола за счет ускорения их метаболизма.

Способ применения и дозы

Таблетки принимать внутрь после приема пищи.

С лечебными целями рекомендуется по 1-2 таблетки 1-3 р/сутки. Суточная доза составляет 5 таблеток.

Детям можно назначать фолиевую кислоту с 3 лет: по 0,25 мг (1/4 таблетки), максимально 2 таблетки/сутки.

Продолжительность приема фолиевой кислоты – от 20 до 30 суток.

Беременным рекомендуется назначать по 4 таблетки/сутки. При лактации – по 3 таблетки/сутки.

Передозировка

Сообщений о передозировке фолиевой кислоты не поступало.

Побочные реакции

Обычно фолиевая кислота переносится хорошо. Возможны реакции аллергического характера, которые купируются приемом противоаллергических средств, отменой препарата или снижением его дозы.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в сухом и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в упаковке.

Производитель

Квайссер Фарма ГмбХ и Кою КГ, Германия.