

## **Состав**

*действующее вещество:* серебра протеинат;

1 флакон содержит 0,1г серебра протеинату;

растворитель - вода для инъекций, 10 мл.

## **Лекарственная форма**

Порошок для приготовления раствора для интраназального применения.

*Основные физико-химические свойства:* порошок - желто-коричневый или коричневый легкий порошок, гигроскопичен, чувствителен к действию света; растворитель - прозрачная бесцветная жидкость восстановлен раствор - жидкость коричневого цвета, допускается опалесценция.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при заболеваниях полости носа. Средства для лечения заболеваний полости носа.

Код АТХ R01 АХ.

## **Фармакодинамика**

Препарат обладает вяжущим, антисептическим и противовоспалительным действием. Ионы серебра, входящие в состав препарата, оказывают бактерицидное и бактериостатическое действие на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Moraxella catarrhalis* и другие, а также грибковой флоры. В основе бактерицидного действия препарата Протаргол Беби лежит образование защитной пленки за счет осаждения серебром белков бактерий на поврежденной инфекционным процессом слизистой оболочке, что, в свою очередь, способствует уменьшению чувствительности слизистых оболочек к инфекционным агентам, уменьшает просвет капилляров, тем самым тормозит воспалительные процессы. Кроме того, Протаргол Беби оказывает мягкое сосудосуживающим действием.

## **Фармакокинетика**

При местном применении Протаргол Беби плохо всасывается, поэтому не имеет общего системного действия.

## **Показания**

Применяют в комплексном лечении инфекционно-воспалительных процессов полости носа и придаточных пазух носа, в том числе для лечения острых или хронических ринитов, синуситов, аденоидитов. Лечение рецидивирующих назофарингит.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующему веществу.

### Особые меры безопасности.

Не допускать попадания препарата в глаза.

Перед применением небольшое количество препарата нанести на кожу в области локтевого сгиба для выявления возможной индивидуальной непереносимости.

При возникновении симптомов индивидуальной непереносимости (раздражение, жжение, зуд кожи) промыть место нанесения большим количеством воды.

Отказаться от применения препарата и при необходимости обратиться к врачу.

Следуйте рекомендованных доз и способа применения препарата. Препараты серебра при чрезмерном применении в течение длительного периода времени могут привести аргирии (пигментация, вызванная отложением серебра в тканях).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не рекомендуется одновременное местное применение средств, содержащих соли алкалоидов и органические основания (адреналин). Протаргол Беби фармацевтически несовместим с цинка сульфатом. Серебра протеинат может взаимодействовать с препаратами, содержащими папаин. Одновременное применение препарата Протаргол Беби и препарата, содержащего папаин, может уменьшить ферментное действие последнего.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не обнаружено.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат предназначен для применения у детей в возрасте от рождения до 3 лет.

## **Способ применения и дозы**

Применяется интраназально в виде 1% раствора, перед применением необходимо взболтать.

*Применять детям от рождения до 3 лет.*

После очистки носовой полости в каждый носовой ход закапывать по 1-3 капли 1% раствора 2-3 раза в сутки в течение 5-10 дней.

### *Способ приготовления 1% раствора Протаргол Беби*

Содержимое флакона растворить в 10 мл растворителя (вода для инъекций):

1. Отвинтить колпачок во флаконе с порошком.
2. Открыть однократной контейнер с растворителем (вода для инъекций), повернув верхнюю часть контейнера против часовой стрелки.
3. Полностью вылить растворитель во флакон с порошком.
4. Навинтить колпачок на флакон и взболтать до полного растворения препарата (8-10 минут).
5. Заменить колпачок на крышку-капельницу, что добавляется. Раствор готов к применению. Перед применением капельницу следует промыть теплой водой и проверить на наличие повреждений. Поврежденную капельницу применять нельзя.

## **Дети**

Протаргол Беби рекомендуется детям в возрасте от рождения до 3 лет.

Детям от рождения до 3 месяцев препарат применяется только по назначению врача.

## **Передозировка**

О случаях передозировки препарата Протаргол Беби не сообщалось.

Однако при длительном неконтролируемом применении в больших количествах возможно накопление последнего в селезенке, коже, слизистых оболочках, что придает им серо-зеленого или аспидного окраску, особенно на открытых

участках тела (аргирии). УФ-лучи усиливают пигментацию. Первые признаки аргирии при лечении препаратами серебра проявляются через 2-4 года от начала постоянного ежедневного применения препарата: возможно отложение серебра в соединительной ткани, стенках капилляров разных органов, в том числе в почках, костном мозге. При аргирии появляются жалобы на боль в правом подреберье, увеличение печени, ослабление остроты зрения в сумерках.

### **Побочные реакции**

Данных о частоте перечисленных эффектов нет.

*Со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции в виде крапивницы, анафилактического шока, отека Квинке, атопического дерматита.

*Общие нарушения и реакции в месте введения:* ощущение легкого раздражения слизистой оболочки, жжение, зуд.

Длительное применение может вызвать аргирии (см. Раздел «Передозировка»).

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный раствор хранить в холодильнике не более 30 суток (при температуре от 2 до 8 °С).

### **Упаковка**

По 0,1 г порошка в стеклянном флаконе оранжевого цвета, закрытом крышкой с контролем первого вскрытия. Флакон с порошком, одноразовый контейнер с растворителем (10 мл) и крышка-капельница в коробке из картона.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «Исток-Плюс».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 69032, г. Запорожье, ул. Макаренко, 4.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).