

Состав

основные вещества: натриевая соль R(+) - энантиомера альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты — 375 mg (мг) (что эквивалентно 300 mg (мг) R(+) - энантиомера альфа-липоевой кислоты);

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, кальция стеарат, лактоза.

Показания

«РАЙТ» рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник альфа-липоевой кислоты при состояниях, связанных с оксидативным стрессом и нарушениями работы антиоксидантной системы.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и период лактации.

Предостережения

- Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания;
- Одновременный прием пищи затрудняет всасывание АЛК, поэтому важно употреблять диетическую добавку до первого приема пищи;
- Диетическая добавка «РАЙТ» содержит лактозу, поэтому ее не следует применять при непереносимости галактозы, недостаточности лактазы или синдроме недостаточности всасывания глюкозы-галактозы;
- При наличии желчнокаменной болезни следует проконсультироваться с врачом перед приемом препарата;
- Признаками индивидуальной непереносимости являются возможные изменение или нарушение вкусовых ощущений, тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Такие реакции устраняются путем прекращения приема диетической добавки;
- Эффективность цисплатина снижается при одновременном применении с АЛК;
- АЛК является хелатором металла, и поэтому ее не следует применять одновременно с соединениями металлов (например, с пищевыми добавками, содержащими железо, магний) или с молочными продуктами, поскольку они содержат кальций;

- Если общую суточную дозу диетической добавки «РАЙТ» применять за 30 минут до завтрака, тогда пищевые добавки, содержащие железо, магний, кальций, можно принимать днем или вечером;
- Прием диетической добавки может усилить сахароснижающее действие инсулина или пероральных противодиабетических средств, поэтому, особенно на начальной стадии употребления АЛК, показан тщательный контроль уровня глюкозы в крови;
- Во избежание симптомов гипогликемии в отдельных случаях может возникнуть необходимость в снижении дозы инсулина или перорального противодиабетического средства;
- Капсулы диетической добавки «РАЙТ» имеют специфический запах, свойственный основному веществу.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Принимать взрослым по 1 капсуле в сутки натощак за 30 минут до первого приема пищи, запивая питьевой водой. Минимальная продолжительность курса – 2 месяца. При необходимости курс можно повторить. По назначению врача суточная доза и курс потребления могут быть изменены. Перед началом применения рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Срок годности

2 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 капсул во флаконе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 02088, г. Киев, ул. Евгения Харченко, 55.