

Состав

Гидролизированный коллаген типа II - 750 мг, хондроитина сульфат - 240 мг, аскорбат кальция - 132 мг, гиалуроновая кислота - 120 мг.

Описание

Гиалуроновая кислота - полисахарид, содержащийся практически во всех соединительных тканях организма. Наиболее распространенный компонент хрящей, синовиальной (внутрисуставной) жидкости, а также кожи и стекловидного тела глаз. Гиалуроновая кислота регулирует водный баланс кожи, ее тонус и упругость. Она выполняет функцию своеобразной молекулярной губки, удерживая воду и придавая коже упругость и эластичность. Однако, с возрастом синтез гиалуроновой кислоты снижается, и, в результате, кожа теряет свою упругость. Для регулирования водного баланса необходим дополнительный прием гиалуроновой кислоты, который обеспечит плотность, упругость, эластичность кожи и сохранения в ней влаги, что, в результате, определяет молодость, красоту и привлекательность кожи вообще, и кожи лица в частности. Гиалуроновая кислота - важный компонент суставного хряща, в котором присутствует в виде оболочки каждой клетки (хондроцит). Тем самым гиалуроновая кислота защищает клетки хряща от действия различных агрессивных веществ, а также удерживает необходимые компоненты внутри. Являясь основным компонентом синовиальной жидкости, гиалуроновая кислота обеспечивает амортизационный эффект, предупреждая износ суставных поверхностей при трении, помогает улучшить подвижность суставов. Хондроитин сульфат, также входит в состав комплекса, стимулирует регенерацию суставного хряща, уменьшает воспаление и боль в пораженных суставах. Хондроитин сульфат стимулирует синтез эндогенной гиалуроновой кислоты. Данная формула содержит натуральный витамин С, который обладает антиоксидантными свойствами и участвует в синтезе коллагена, а также гидролизированный коллаген. Все вышеуказанные компоненты необходимы для укрепления ногтей, волос, здоровья кожи и других соединительных тканей.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 1 таблетке в день во время еды.