

Описание

Живые бактерии *Bacillus subtilis*, которые входят в состав Субалин, обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (стафилококков, энтеробактерий, дрожжеподобных грибов рода *Candida*) и способствуют нормализации качественного и количественного состава кишечной микрофлоры (бифидумбактерий, лактобацилл, кишечной палочки), а также характеризуются противовирусной активностью вследствие синтеза $\alpha 2$ -интерферона.

Субалин способствует нормализации микрофлоры кишечника, предупреждению и коррекции дисбиоза, снижению уровня эндогенной интоксикации, повышает сопротивляемость организма вирусным инфекциям. За счет устойчивости к кислой среде желудка споры в неизмененном виде проникают в кишечник, где превращаются в вегетативные клетки.

Субалин рекомендуется употреблять как диетическую добавку к рациону питания, которая является источником активной культуры *Bacillus subtilis*, для взрослых и детей от рождения с целью нормализации микрофлоры кишечника и улучшения его функционального состояния в ситуациях, связанных с повышением риска кишечных нарушений, в том числе при изменении рациона питания, переезде, путешествиях; для улучшения пищеварения, повышения иммунитета и общей сопротивляемости организма инфекциям дыхательных путей и ЖКТ; предотвращения дисбиоза и антибиотикассоциированной диареи во время приема антибиотиков.

Особенности применения

Не употреблять при индивидуальной чувствительности к компонентам добавки.

Не превышать указанную дозу для ежедневного употребления.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Перед употреблением добавки следует проконсультироваться с врачом.

Не является лекарственным средством.

Способ применения и дозы

Употреблять внутрь в форме раствора за 30–40 мин до еды.

Детям от рождения: по 1 саше 2 раза в сутки.

Взрослым: по 2 саше 2–3 раза в сутки. Взрослым целесообразно употреблять Субалин-Форте, содержащий $2 \cdot 10^9$ живых микробных клеток *Bacillus subtilis*.

Способ растворения.

Содержимое саше растворить в 50–100 мл охлажденной до комнатной температуры кипяченой воды. Добавку растворять в течение 1–2 мин до образования суспензии. Не разбавлять горячей жидкостью! Недопустимо хранение после растворения.

Рекомендуемый курс — 20 дней.