

Состав

активные вещества: цинка сульфат моногидрат - 54,9 mg (мг) (что соответствует 20 mg (мг) элементарного цинка);

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, маннитол, сорбитол, натрия крахмала, натрия хлорид, натрия бикарбонат, лимонная кислота, натрия сахарин, Ludiflash ® , этилцеллюлоза, макрогол, жидкий парафин, тальк, магния стеарат.

Описание

Цинк - это жизненно важный для человека микроэлемент, который участвует в регуляции многих ферментных систем. Также цинк оказывает существенное влияние на иммунную систему. Взаимодействие между поступлением микроэлемента и уровнем противoinфекционной защиты организма проявляется в том, что устранение дефицита цинка способствует восстановлению уровня иммунной активности. Такой рост уровня иммунной активности может продолжаться в период до 2-3 месяцев после завершения приема.

Добавка диетическая ацинтак обеспечивает соблюдение суточного дозирования цинка, которое соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2004) относительно ослабления течения диареи.

Показания

Рекомендуется в качестве добавки диетической к рациону питания как дополнительный источник цинка с целью облегчения течения диареи у детей и взрослых.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и период лактации.

Особенности применения

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Не употреблять детям до 6 месяцев без консультации с врачом.

Диета, богатая клетчаткой (например, отруби), фосфором (например, молочные продукты), фитинами (например, бобовые, цельнозерновые изделия), уменьшает всасывание цинка вследствие образования соединений, которые не усваиваются. Поэтому перерыв между употреблением вышеупомянутых продуктов и приемом препаратов цинка должна быть не менее 2 часов.

Следует избегать одновременного употребления добавки диетической АЦИНТАК и комплексных витаминных препаратов, содержащих цинк.

Способ применения и дозы

Перед употреблением таблетку следует растворить в ложке, наполненной питьевой или кипяченой, охлажденной до комнатной температуры водой. Принимать после еды в течение 10-14 дней.

Детям до 6 месяцев - по 1/2 таблетки (10 мг/мг) 1 раз в сутки.

Детям с 6 месяцев и взрослым - по 1 таблетке (20 мг/мг) 1 раз в сутки.

Таблетка имеет линию деления, что облегчает соблюдение схемы дозировки.

Срок годности

3 года.