

## **Состав**

*Состав на 1 стик:*  $6 \times 10^9$  Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium.

*Вспомогательные вещества:* L-аскорбиновая кислота, полидекстроза, порошок овощной пасты, FOS-волокна, порошок апельсиновой вкусовой добавки, лактулоза, апельсиновый ароматизатор, молочный ароматизатор, крахмал кукурузный, стеарат магния.

## **Свойства**

Биолакт Форте содержит бактерии с четырьмя слоями покрытия (Quadruple Coating), что обеспечивает высокую степень выживания и сохранения активности живых бактерий во внешней среде (в течение производственного процесса и хранения), и защищает бактерии от действия желудочного сока и желчи.

Благодаря системе покрытия увеличивается количество живых бактерий, которые достигают кишечника, что способствует их адгезии и размножению на эпителиальных клетках кишечника.

Защитное покрытие не нарушается, пока на бактерии не начнет влиять рН-среда в тонком кишечнике, в котором пробиотики эффективны.

После растворения покрытия в кишечнике бактерии регидруются и начинают активно размножаться, в том числе - благодаря наличию в Биолакт Форте пребиотиков - лактулозы и фруктоолигосахариды, которые являются питательным субстратом для полезных бактерий.

Уникальная оболочка и система защиты максимизирует уровень выживания бактерий и существенно увеличивает их эффективность по сравнению с непокрытыми бактериями.

Бактерии, входящие в состав Биолакт Форте, колонизируют различные отделы пищеварительного тракта, обеспечивает восстановление баланса кишечной микрофлоры как в тонком, так и в толстом отделах кишечника. Это, в свою очередь, повышает неспецифическую резистентность организма, поддерживает равновесие иммунной, нервной и других систем, улучшает усвоение питательных веществ и витаминов.

Лиофилизация бактерий и двойная оболочка обеспечивают длительное сохранение высокой биологической активности микроорганизмов при комнатной

температуре.

## **Показания**

Порошок Биолакт Форте рекомендуется:

- для восстановления баланса микрофлоры кишечника и устранения последствий антибиотикотерапии (дисбактериоза кишечника, антибиотик-ассоциированной диареи, псевдомембранозного колита) во время и после приема антибиотиков;
- при нарушении равновесия кишечной микрофлоры (дисбактериозе);
- для поддержания нормальной функции пищеварения;
- для устранения проявлений желудочно-кишечных расстройств: запор, диарея, метеоризм (в том числе - связанных с изменением пищевого режима и рациона, воды, стрессом и др.);
- во время коррекционного (диетического) питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, гастроэнтерит, колит, синдром раздраженной толстой кишки, нарушение всасывания, инфекционные кишечные заболевания);
- для поддержания нормальной функции пищеварения в условиях постоянных стрессов и применение современных продуктов, содержащих компоненты, которые неблагоприятно влияют на микрофлору кишечника;
- в комплексе мер по устранению дисбактериоза влагалища у женщин;
- при лактазной недостаточности;
- при аллергических заболеваниях (атопический дерматит, экзема и другие аллергодерматозы, пищевая аллергия);
- для улучшения общего состояния при синдроме хронической усталости;
- в комплексе мероприятий при остеопорозе, в том числе у женщин в период менопаузы (для улучшения усвоения кальция).

Является полезным для детей в период роста, так как улучшает биодоступность витаминов и минералов.

## **Противопоказания**

Не применять Биолакт Форте в случае аллергии на его компоненты.

## **Способ применения и дозы**

Для поддержания нормальной пищеварительной функции взрослым и детям старше 3-х лет по 1 стику 1 раз в день 7-14 дней. Один - четыре курса в год.

При наличии желудочно-кишечных расстройств, взрослым и детям старше 3-х лет рекомендуется принимать по 1 стику 2-3 раза в день 7-14 дней. При необходимости срок употребления может быть продлен до 1 месяца.

Во время приема антибиотиков курс Биолакт Форте составляет время приема антибиотиков плюс 4 недели после окончания курса антибиотикотерапии. На стадии приема антибиотиков возможно увеличение дозы Биолакт Форте до 2 стиков 2-3 раза в день.

Промежуток времени между приемом антибиотика и Биолакт Форте должен составлять не менее 3-х часов.

Пробиотики являются физиологическими для человека продуктами, поэтому передозировка ими практически невозможна.

В отличие от фармакопейных препаратов пробиотики в детском возрасте (за исключением детей первых трех лет жизни) назначают почти в тех же дозах, что и взрослым.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Избегать солнечного света, высоких температур и высокой влажности.

### **Упаковка**

Порошок в стиках, по 10 стиков в картонной упаковке.

### **Производитель**

Ildong Bioscience Co., Ltd/Ildong Pharmaceutical Co., Ltd, Корея.