

Состав

действующее вещество: ламинарии слоевища.

Лекарственная форма

Слани.

Основные физико-химические свойства: кусочки сланей разной формы, от светло-оливкового до темно-оливкового, зеленовато-коричневого, красновато-коричневого, темно-серого с зеленоватым оттенком, зеленовато-черного цвета, снаружи покрытые белым налетом солей.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительные средства. Код АТХ А06А.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают противовоспалительное, мочегонное, общеукрепляющее, противосклеротическое, гипогликемическое действие, активно влияют на функцию щитовидной железы, регулируют обмен веществ, способствуют стулу кишечника, способствуют выведению радионуклидов из организма.

Показания

Хронические атонические запоры; хронические энтероколиты, проктиты - в составе комплексной терапии; легкие формы диффузного токсического зоба (базедовой болезни) - в составе комплексной терапии; профилактика эндемического зоба, атеросклероза; как дополнительное средство при гипертиреозе.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к препаратам йода. Повышенная чувствительность к морской капусте. Склонность к кровотечению, нефритам, геморрагическим диатезам, фурункулезу, туберкулезу легких.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлен.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не установлен.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Взрослым применять по $\frac{1}{2}$ -1 чайной ложке морской капусты утром или вечером, запивая $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ стакана воды.

При дисфункции щитовидной железы курс лечения составляет 15-30 дней, в других случаях длительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Опыт применения детям отсутствует.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Реакции гиперчувствительности. При длительном применении и повышенной чувствительности к йоду возможны проявления йодизма (насморк, слезотечение, гиперсаливация). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре выше 30 °С.

Упаковка

По 150 граммов в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Ликтравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.