

Состав

1 ампула (10 ml (мл)) раствора содержит:

- цитидина 5'-монофосфат -150 mg (мг);
- уридина 5'-монофосфат -150 mg (мг);
- цинк-1,5 mg (мг).

Вспомогательные вещества: вода очищенная, подсластители (сорбитовый сироп, мальтит), стабилизатор (глицерин), цитидин-5-монофосфат, уридин-5-монофосфат, регулятор кислотности (кислота лимонная), ароматизатор, консерванты (калия сорбат, натрия бензоат) , сульфат цинка, краситель (сахарный колер).

Лекарственная форма

Пищевой продукт для специальных медицинских целей с подсластителями.

Диетическая добавка к рациону питания в качестве источника питательных веществ, способствующих улучшению трофики и восстановлению поврежденных нервных волокон при невралгиях и полиневропатиях различного происхождения.

Показания

Аксотроф — комплекс нуклеотидов и цинка, необходимых для улучшения трофики и восстановления поврежденных нервных волокон при невралгиях и полинейропатиях, усиливает метаболические процессы, способствующие регенерации.

Аксотроф можно применять при:

- инфекционных(вирусных) повреждениях нервов;
- в лечении люмбаго, внутри, радикулит;
- посттравматического, ишемического невропатии;
- невралгиях, неврите нервного тригемина, плекситах;
- костей и суставов невралгии (люмбаго, поясничная боль, пояснично-крестцовый пояс, радикулопатия), межреберных невралгиях;
- метаболических невралгиях (последствия алкогольной зависимости, осложнения диабета — полинейропатия);
- ганглионити, вертеброгенной боли, параличи Белла, миопатиях, синдроме кистевого туннеля;
- тяжелых, легких и средних невропатиях различного генеза;

- при межпозвонковых радикулопатиях).

Не является лекарственным средством. Диетическая добавка.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам средства, беременность и период лактации.

Применение в период беременности или кормления грудью

Эффективность и безопасность потребления в период беременности и кормления грудью не установлены, поэтому не рекомендуется применять продукт в этот период.

Способ применения и дозы

Аксотроф предназначен для внутреннего употребления без необходимости разведения, но содержимое ампулы может быть разведено в воде. Для разведения отломите конец ампулы с одной стороны.

- Осторожно переверните ампулу отломанным краем над стаканом с водой (100 ml (мл)) и отломите другой конец: жидкость начнет вытекать сразу после отламывания другого конца.
- Взрослым рекомендуется принимать 1 ампулу один раз в день после еды. Продолжительность потребления определяет врач индивидуально.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Срок годности

36 месяцев от даты производства.

Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл раствора в ампулах, 20 ампул в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лабиалфарма, С.А., Эдифисио Лабиалфарма, Португалия.