

## **Состав**

1 таблетка содержит:

*активные ингредиенты:* экстракт травы пастушьей сумки - 200 мг (mg), экстракт коры калины - 150 мг (mg), рутин (рутозид) - 50 мг (mg);

*вспомогательные вещества:* наполнители: целлактоза-80, натрия кроскармеллоза, магния стеарат оболочка таблетки: сухая смесь;

*оболочка таблетки:* гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль, титана диоксид, рибофлавин, оксид железа красный.

## **Лекарственная форма**

Добавка диетическая на основе растительного сырья.

## **Фармакологические свойства**

Добавка содержит комбинацию натуральных растительных экстрактов и рутину, которые способствуют нормализации течения менструации.

*Экстракт травы пастушьей сумки* содержит флавоноиды (кверцетин, диосмин, гесперидин и т.д.), аминокислоты, сапонины, витамин С, каротиноиды и другие вещества, благодаря чему проявляет кровоостанавливающие свойства; способствует улучшению перистальтики кишечника; применяется при атонии матки, маточных кровотечениях, длительных и обильных месячных, в том числе, в предменопаузальный период.

*Экстракт коры калины* содержит витамины (С, К, каротин), флавоновый гликозид вибурнин и дубильные вещества, которые обуславливают кровоостанавливающие, а также слабые мочегонные свойства, благодаря чему кора калины применяется при дисменорее (болезненных менструациях).

*Рутин* способствует уменьшению проницаемости и ломкости стенок капилляров, благодаря чему может положительно влиять на эластичность сосудов, способствовать уменьшению кровопотери, обеспечивать ангиопротекторные свойствами, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие.

### **Показания**

Рекомендуется употреблять как дополнительный источник витаминов (К, С, бета-каротина, рутин), дубильных веществ, флавоноидов (вибурнин) с целью нормализации функционального состояния женских репродуктивных органов при меноррагиях (обильных менструациях).

### **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период лактации, нарушения в системе свертывания крови, тромбозы, склонность к тромбозам.

### **Особенности применения**

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Принимать взрослым (женщинам) по 1 таблетке 2 раза в сутки независимо от приема пищи; запивая достаточным количеством питьевой воды. Рекомендуется начинать применение за 3-7 дней до начала менструации и продолжать до ее завершения. Перед применением рекомендуется консультация врача.

### **Срок годности**

24 месяца от даты производства.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 0 ° С до 25 ° С.

**Упаковка**

По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ПАО «Киевмедпрепарат».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.