Состав

1 капсула содержит:

Действующие вещества:

- Экстракт травы спорыша - 160 мг.
- Экстракт листьев берёзы - 13,40 мг.
- Экстракт корневища пырея - 20,10 мг.
- Экстракт корней петрушки - 10,05 мг.
- Экстракт травы хвоща полевого - 6,7 мг.
- Экстракт корней любистка - 6,7 мг.
- Экстракт травы золотарника - 5,75 мг.

Вспомогательные вещества: желатин, вода, целлюлоза, титана диоксид, диоксид кремния, магниевые соли жирных кислот, оксид железа желтый, медные комплексы хлорофиллов.

Питательная (пищевая) ценность на 100 г продукта: белки - 0,18 г; углеводы - 0,52 г; жиры - 0 г; насыщенные жирные кислоты - 0,2 г.

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта - 382 ккал (1621 кДж).

Без ГМО.

Лекарственная форма

Диетическая добавка. Капсулы для лечения заболеваний мочеполовой системы и почек.

Описание

- Спорыш обычный (Polygonum aviculare L.) - с лекарственной целью используют молодые побеги в период цветения. Содержит витамины С и обладает мочегонным, жаропонижающим, противоглистным, вяжущим, общеукрепляющим, тонизирующим, кровоостанавливающим и противовоспалительным действием.
- Пырей ползучий (Agropyron repens L.) в народной медицине применяют как мочегонное, потогонное, отхаркивающее, слабительное и регулирующее солевой обмен средство. При желче- и мочекаменной болезнях, нефрите, цистите, недержании мочи, гепатите, холецистите, геморрое, гастрите,

энтерите, колите, простудных заболеваниях, трахеите, пневмонии, экссудативном диатезе, экземе, фурункулезе, гипертонической болезни, сахарном диабете.

- Экстракт листьев березы (Betula pendula Roth. (B. Verrucose Ehrh.) широко используют при заболеваниях почек, малокровии, как мочегонное и потогонное средство.
- Хвощ полевой (Equisetum arvense L) увеличивает выделение мочи, уменьшает количество белка в ней, улучшает общий обмен веществ в организме, уменьшает отеки, уменьшает воспаление, способствует заживлению ран, имеет кровоостанавливающее, вяжущее, антисептическое и дезинфицирующее действие.
- Корни любистка (Levistici radix) обладают мочегонным, ветрогонным, спазмолитическим (снимает кишечные колики), болеутоляющим, тонизирующим свойствами. Активизирует половую функцию у мужчин и нормализует течение менструации у женщин. Применяется при ряде заболеваний мочевых путей: пиелонефрите, цистите, гломерулонефрите и мочекаменной болезни.
- Трава золотарника (Extractum Herbae Solidaginis virgaureae siccum) обладает противовоспалительным действием. Оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру мочевыводящих путей.
- Одновременно экстракт золотарника обладает антибактериальным действием, в том числе по Staphylococcus aureus, St. epidermidis, St. Faecafis, Bacillus subtilis и другие. Активные вещества экстракта тормозят рост ряда грибов C. albicans, C. krusei, C. tropicalis и другие. Предотвращает камнеобразованию путем разведения мочи и снижения концентрации в ней литогенных субстанций. Поскольку воспаление и сужение мочевыводящих путей связано с наличием мочевых камней, важное значение для вторичной профилактики имеет диуретическое и противовоспалительное действие золотарника.

Показания

Рекомендуется в рацион питания как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения при инфекциях почек и мочевого пузыря для: поддержания правильного функционирования почек (корни петрушки, травы хвоща полевого, корневища пырея и листьев березы), поддержания нормального функционирования мочевыводящих путей (травы хвоща полевого, корни любистока, травы золотарника и листья березы), содействия удалению воды из организма, помогает удалить с мочой нежелательные продукты обмена веществ (корневища пырея, корни любистока, травы золотарника и листья березы), помощи в устранении патогенных бактерий

из мочевыводящих путей. Положительно влияет на уменьшение грапмозитивной микрофлоры на стенках мочевыводящих путей (травы спорыша). Обладает противовоспалительными, спазмолитическими, антибактериальными и мочегонными свойствами.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особенности применения

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Продукт не должен использоваться в качестве заменителя полноценного питания.

Не является лекарственным средством.

Применение в период беременности или кормления грудью

Женщинам в период беременности и кормления грудью следует проконсультироваться с врачом перед применением.

Способ применения и дозы

Детям от 3-х лет и взрослым - по одной капсуле 2 раза в сутки, запивая водой (желательно не меньше 0,5 стакана воды).

Принимать перед едой.

Срок применения - до 30-ти дней по одной капсуле 2 раза в сутки.

Профилактически - 2 раза в год по 10 дней по одной капсуле 2 раза в сутки.

Дети

Применять детям с 3 лет.

Срок годности

2 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, в защищенном от влаги, света и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Польфарма СА», Польша.