

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 г сбора содержит ромашки цветков (*Matricariae flores*) 200 мг, грязи обычного побегов (*Ledi palustris cormus*) 200 мг, календулы цветков (*Calendulae flores*) 200 мг, фиалки травы (*Violae herba*) 200 мг, солодки корней (*Glycyrrhizae radices*) 150 мг, мяты перечной листья (*Menthae piperitae folia*) 50 мг.

## **Лекарственная форма**

Сбор.

*Основные физико-химические свойства:* измельченное сырье: смесь неоднородных кусочков желтовато-зеленого цвета с желто-оранжевыми, красновато-коричневыми, серовато-коричневыми, темно-зелеными, серовато-зелеными, желтовато-белыми, желтовато-серыми или синевато-фиолетовыми вкраплениями; порошок крупный: смесь неоднородных кусочков коричневатого желтого цвета с зелеными, белыми, желто-оранжевыми и коричневыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A10.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обволакивающее действие, усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют разжижению и отхождению мокроты, смягчают и уменьшают кашель.

## **Показания**

В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (в том числе бронхита, трахеита), связанных с нарушениями бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату или к салицилатам.  
Гломерулонефрит, гепатит, спазмофилия, круп, бронхиальная астма.

Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), нарушение функции печени и почек.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении может усиливать эффект снотворных средств и средств, угнетающих ЦНС. Не следует применять вместе с препаратами, угнетающими кашель. Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.

### **Особенности применения**

У пациентов с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) возможно усиление изжоги.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не изучена.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

2 столовые ложки препарата поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде до еды в течение 2-3 недель: взрослым и детям старше 12 лет - по  $\frac{1}{2}$  стакана 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1-2 столовые ложки 3 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 5 лет - по 2-3 чайные ложки 3 раза в сутки.

Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем полученной водной вытяжки довести кипяченой водой до 100 мл.

Принимать в теплом виде до еды в течение 2-3 недель: взрослым и детям старше 12 лет - по 100 мл 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 2-3 столовые ложки 3 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 5 лет - по 1-2 столовые ложки 3 раза в сутки.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 ° С) не более 2 суток.

## **Дети**

Препарат применяют детям в возрасте от 3 лет.

## **Передозировка**

Передозировка и длительное применение (более 2 месяцев) может привести к нарушению водно-электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиемической миопатии и миоглобинурии, возникновение тошноты, рвоты, диареи, аллергических высыпаний на коже. Возможно усиление побочных эффектов.

## **Побочные реакции**

Повышение артериального давления. Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, контактный дерматит, тошнота, рвота, диарея). При появлении побочных реакций следует прекратить прием перепарату и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.