

## **Состав**

*действующее вещество:* биклотимол;

1 флакон содержит биклотимол 750 мг;

*вспомогательные вещества:* спирт бензиловый, динатрия эдетат, аммония глициризинат, масло звездчатого аниса, натрия сахарин, целлюлоза микрокристаллическая, лецитин соевый, глицерин, этанол 95 %, вода очищенная, метилпарагидроксибензоат (Е 2

Газ, образующий давление: азот.

## **Лекарственная форма**

Спрей оромукозный.

*Основные физико-химические свойства:* однородная взвесь бежевого цвета с характерным запахом аниса.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые при заболеваниях гортани. Код АТХ R02A.

## **Фармакодинамика**

Антисептическое, анальгезирующее и противовоспалительное средство.

Биклотимол является фенол производным веществом с антибактериальной активностью в отношении стафилококков, стрептококков, микрококков и коринебактерий. Коагулирует белки микробной клетки. Также оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действия.

Препарат всасывается через слизистые очень медленно, что обеспечивает его длительное присутствие в полости рта.

## **Показания**

Местное симптоматическое лечение инфекционных и воспалительных заболеваний полости рта и носоглотки: ангина, фарингит, афтозный стоматит, гингивит, пародонтоз.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность. Детский возраст до 2,5 лет (из-за угрозы развития ларингоспазма).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не обнаружено.

### **Особенности применения**

Применение препарата более 5 дней может привести к нарушению гомеостаза нормальной микрофлоры полости рта с риском распространения бактериальной или грибковой инфекции. Одновременное применение других антисептических средств следует исключить, поскольку возможно нежелательное взаимодействие (антагонизм, инактивация).

В случае ухудшения состояния, в частности, повышения температуры или если в течение 5 дней не наступило улучшение, необходимо провести повторное обследование больного и изменить тактику лечения.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Адекватные и хорошо контролируемые исследования безопасности применения препарата в период беременности или кормления грудью не проводились.

### **Способ применения и дозы**

Применять местно. При орошении полости рта флакон следует держать в вертикальном положении. Перед применением флакон необходимо встряхнуть.

Для взрослых и детей от 2,5 лет.

*Взрослым и детям в возрасте от 2,5 лет:* по 2 впрыска 3 раза в сутки.

Лечение ограничено до 5 дней.

### **Дети**

Препарат не применяют детям до 2,5 лет.

## **Передозировка**

Не обнаружено.

## **Побочные реакции**

### Дерматологические расстройства

*Очень редкие:* аллергические расстройства - отек губ, крапивница, кожная сыпь, эритема, ангионевротический отек.

Ввиду содержания в препарате метилпарагидроксибензоата и соевого лецитина возможно развитие аллергических реакций у определенных групп пациентов.

## **Срок годности**

5 лет.

## **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

## **Упаковка**

Аэрозольный флакон емкостью 30 г в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Лаборатории Бушара Рекордати.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Парк Мекатроник, 03410, Сент-Виктор, Франция.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).