

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Aconitum napellus D4 - 120 мг
Bryonia D4 - 60 мг Eupatorium perfoliatum D3 - 30 мг Lachesis D12 - 60 мг
Phosphorus D5 - 30 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат лактоза моногидрат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские с фаской, от белого до желто-белого цвета, возможны темные и желтые вкрапления, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат имеет дезинтоксикационное, противовоспалительное, иммунокоригующее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

В комплексном лечении и профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций; инфекционных и острых воспалительных заболеваний, сопровождающихся интоксикацией.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При содержании симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия неизвестны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, врач решает индивидуально.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет - 1 таблетка в рот (до полного рассасывания). Принимать 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. В случае острого начала заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Курс лечения - 5-10 дней.

После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки еще в течение 5-7 дней с целью профилактики осложнений.

С целью профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в осенне-зимний период принимать разовую дозу 1 раз в сутки (утром), в период эпидемии гриппа - 2 раза в сутки (утром и вечером).

Дети

Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 6 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях у лиц с индивидуальной непереносимостью возможно возникновение реакций гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, гиперемия, кожные высыпания, зуд.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

50 таблеток в полипропиленовой контейнере, в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ /

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия /

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).