

## **Состав**

*действующее вещество:* настойка листьев эвкалипта (Tinctura Eucalypti) (1: 5)  
(экстрагент - этанол 70%);

1 флакон содержит настойки листьев эвкалипта (Tinctura Eucalypti) (1: 5)  
(экстрагент - этанол 70%) - 25 мл.

## **Лекарственная форма**

Настойка.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета со специфическим запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Эвкалипта настойка имеет в своем составе дубильные вещества, элаговую кислоту, флавоноиды, смолы, воск, эфирное масло, в состав которой входят различные терпеновые соединения, особенно активные в грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, которые пагубно влияют на грибы и простейшие. Эвкалипт подавляет рост золотистого стафилококка, эшерихий, туберкулезных микобактерий, трихомонад, дизентерийной амебы. Основным компонентом эфирного масла является цинеолмоноциклический терпен. Эвкалипта настойка обладает антисептическим, противовоспалительным и дезинфицирующим действием, обусловленным окислительным эффектом цинеолмоноциклических терпенов и противовоспалительным воздействием, связанным практически со всеми физиологически активными веществами, которые входят в ее состав. Препарат проявляет также умеренное седативное (успокаивающее) влияние.

## **Фармакокинетика**

Фармакокинетика не определялась.

## **Показания**

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, носоглотки и ротовой полости (трахеит, ларингит, фарингит, гингивит, стоматит), повреждения кожи (в том числе инфицированные раны), а также легкие формы невротических расстройств (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушение засыпания и сна).

### **Противопоказания**

Бронхиальная астма, бронхоспазм. Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей. Заболевания печени тяжелого течения. Повышенная чувствительность к препарату.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлены.

### **Особенности применения**

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется принимать в течение длительного времени.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

При приеме эвкалипта настойки внутрь следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется применять внутрь женщинам в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Эвкалипта настойку принимают внутрь, а также применяют для полоскания и паровых ингаляций.

Взрослым рекомендуется принимать внутрь по 15-30 капель настойки 3-4 раза в сутки после еды. Детям старше 12 лет из расчета 1 капля на 1 год жизни 3-4 раза в сутки после еды.

Для полоскания развести 10-15 капель настойки в 200 мл теплой кипяченой воды.

Паровые ингаляции проводить с помощью ингаляторов любого типа, используя Эвкалипта настойку в неразведенном состоянии или после предварительного разведения ее водой (как для полоскания).

Продолжительность применения препарата зависит от достигнутого лечебного эффекта, определяется врачом.

## **Дети**

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется назначать внутрь детям в возрасте до 12 лет.

## **Передозировка**

Не установлено.

## **Побочные реакции**

Тошнота, рвота и диарея. При повышенной чувствительности к препарату могут возникнуть аллергические реакции (в том числе крапивница, покраснение и высыпания на коже, зуд, отек Квинке).

## **Срок годности**

5 лет.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. При хранении допускается выпадение осадка.

## **Упаковка**

По 25 мл, в пачке или без пачки.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).