

Состав

действующее вещество: настойка листьев эвкалипта (Tinctura Eucalypti) (1: 5)
(экстрагент - этанол 70%);

1 флакон содержит настойки листьев эвкалипта (Tinctura Eucalypti) (1: 5)
(экстрагент - этанол 70%) - 25 мл.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета со специфическим запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Эвкалипта настойка имеет в своем составе дубильные вещества, элаговую кислоту, флавоноиды, смолы, воск, эфирное масло, в состав которой входят различные терпеновые соединения, особенно активные в грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, которые пагубно влияют на грибы и простейшие. Эвкалипт подавляет рост золотистого стафилококка, эшерихий, туберкулезных микобактерий, трихомонад, дизентерийной амебы. Основным компонентом эфирного масла является цинеолмоноциклический терпен. Эвкалипта настойка обладает антисептическим, противовоспалительным и дезинфицирующим действием, обусловленным окислительным эффектом цинеолмоноциклических терпенов и противовоспалительным воздействием, связанным практически со всеми физиологически активными веществами, которые входят в ее состав. Препарат проявляет также умеренное седативное (успокаивающее) влияние.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не определялась.

Показания

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, носоглотки и ротовой полости (трахеит, ларингит, фарингит, гингивит, стоматит), повреждения кожи (в том числе инфицированные раны), а также легкие формы невротических расстройств (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушение засыпания и сна).

Противопоказания

Бронхиальная астма, бронхоспазм. Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей. Заболевания печени тяжелого течения. Повышенная чувствительность к препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлены.

Особенности применения

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется принимать в течение длительного времени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

При приеме эвкалипта настойки внутрь следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется применять внутрь женщинам в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Эвкалипта настойку принимают внутрь, а также применять для полоскания и паровых ингаляций.

Взрослым рекомендуется принимать внутрь по 15-30 капель настойки 3-4 раза в сутки после еды. Детям старше 12 лет из расчета 1 капля на 1 год жизни 3-4 раза в сутки после еды.

Для полоскания развести 10-15 капель настойки в 200 мл теплой кипяченой воды.

Паровые ингаляции проводить с помощью ингаляторов любого типа, используя Эвкалипта настойку в неразведенном состоянии или после предварительного разведения ее водой (как для полоскания).

Продолжительность применения препарата зависит от достигнутого лечебного эффекта, определяется врачом.

Дети

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется назначать внутрь детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Не установлено.

Побочные реакции

Тошнота, рвота и диарея. При повышенной чувствительности к препарату могут возникнуть аллергические реакции (в том числе крапивница, покраснение и высыпания на коже, зуд, отек Квинке).

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. При хранении допускается выпадение осадка.

Упаковка

По 25 мл, в пачке или без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).