

Состав

1 флакон 40 ml (мл) содержит действующие вещества: бактериальный компонент (*Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus megaterium*) - 1×10^6 КОЕ / ml (мл), комплекс ферментов бактерий рода *Bacillus*;

вспомогательные вещества: вода очищенная, диметикон, феноксиэтанол, 1,2-бензизотиазолин-3-он, отдушка.

Лекарственная форма

Спрей для горла.

Показания

Биоплазмикс спрей для горла способствует конкурентной вытеснению нежелательных бактерий, вирусов, грибов, поэтому рекомендован как вспомогательное средство при бактериальных, вирусных и грибковых инфекциях полости рта и горла (при повреждении слизистой горла, хроническом тонзиллите, фарингите, ларингите), первыми проявлениями которых могут быть ощущения першения и раздражение в горле.

Может быть рекомендован людям, испытывающим дискомфорт в горле, связанный с нарушением баланса микрофлоры, вызванное действием неблагоприятных внешних факторов (вдыхание дыма или раздражающих веществ). С целью восстановления баланса микрофлоры ротовой полости может применяться при болезнях зубов и десен; после местного и / или системного применения антибиотиков.

Противопоказания

Не используйте при индивидуальной гиперчувствительности к любому из компонентов средства.

Не применять детям до 3-х лет, женщинам в период беременности и лактации, лицам с иммунодефицитами.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Перед применением рекомендуется консультация врача. Хорошо взболтать перед использованием. Для правильного использования средства Биоплазмикс спрей для горла нужно снять защитный колпачок, держа флакон вертикально, направить распылитель в ротовую полость, нажать двумя пальцами на основание распылителя и впрыснуть. Очистить распылитель и установить защитный колпачок распылитель.

Детям от 3-х лет и старше и взрослым применять по 2-3 впрыскивания 3-4 раза в сутки в течение 10-14 суток. После применения спрея не следует пить и принимать пищу в течение 30 минут. Если симптомы сохраняются более 7 дней или усиливаются при применении изделия, следует проконсультироваться с врачом.

Дети

Детям с 3-х лет.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° C в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ГЕЛИНГХЕМ СПП, Германия.