Состав

действующее вещество: листья эвкалипта;

1 флакон содержит настойки листьев эвкалипта (Eucaliptи folii tinctura) (1: 5) (экстрагент - этанол 70% (об / об)) - 25 мл.

Лекарственная форма

Настойка для наружного и внутреннего применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета со специфическим запахом. При хранении допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Эвкалипта настойка содержит дубильные вещества, элаговую кислоту, флавоноиды, смолы, воск, эфирное масло, в состав которой входят различные терпеновые соединения, особенно активны в отношении грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, подавляют рост грибов и простейших. Эвкалипт подавляет рост золотистого стафилококка, эшерихий, туберкулезных микобактерий, трихомонад, дизентерийной амебы. Основным компонентом эфирного масла является цинеолмоноциклический терпен. Эвкалипта настойка оказывает антисептическое, противовоспалительное и дезинфицирующее действие, обусловленное окислительным эффектом цинеолмоноциклический терпенов и противовоспалительным воздействием, связанным практически со всеми физиологически активными веществами, которые входят в ее состав. Препарат оказывает также умеренный седативный (успокаивающий) влияние.

Показания

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, носоглотки и ротовой полости (трахеит, ларингит, фарингит, гингивит, стоматит), повреждения кожи (в том числе инфицированные раны), а также легкие формы невротических расстройств (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушение засыпания и сна).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Бронхиальная астма, бронхоспазм, воспалительные заболевания пищеварительного тракта и желчевыводящих путей, заболевания печени с тяжелым течением.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлена.

Особенности применения

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется принимать в течение длительного времени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку в составе препарата содержится этанол, не рекомендуется применять Эвкалипт, настойку, во время управления автомобилем или работы с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат противопоказан.

Способ применения и дозы

Эвкалипт, настойку принимают внутрь, а также применяют для полоскания горла и паровых ингаляций.

Взрослым рекомендуется принимать внутрь по 15-30 капель настойки 3-4 раза в сутки после еды. Детям старше 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни 3-4 раза в сутки после еды.

Для полоскания развести 10-15 капель настойки в 200 мл теплой кипяченой воды.

В случае отсутствия пробки-капельницы для применения лекарственного средства, закупоренного пробкой укупорочное, использовать стеклянную пипетку медицинскую, при этом доза применения не изменится.

Паровые ингаляции проводят с помощью ингаляторов любого типа, используя Эвкалипт настойку в неразбавленном виде или после предварительного разведения ее водой (как для полоскания).

Продолжительность применения препарата зависит от достигнутого терапевтического эффекта и определяется врачом.

Дети

Препарат применяют детям старше 12 лет по назначению и под наблюдением врача.

Передозировка

НЕ определялось.

Побочные реакции

При повышенной чувствительности к препарату могут возникнуть аллергические реакции (крапивница, гиперемия, сыпь на коже, отек Квинке, зуд); иногда - контактный дерматит (в области губ) тошнота, рвота и диарея. При выраженных реакциях применение препарата необходимо прекратить.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконах-капельницах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., Г. Лубны, ул. Барвенково, 16.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.