

## **Состав**

*действующие вещества:* амилметакрезол, спирт 2,4 дихлорбензиловый;

1 леденец содержит амилметакрезола 0,6 мг, спирта 2,4 дихлорбензилового 1,2 мг;

*вспомогательные вещества:* сахароза, глюкозы раствор, краситель карамель простая (E 150a), краситель желтый закат FCF (E 110), вкусовая добавка меда, масло мяты, лимонное масло.

## **Лекарственная форма**

Леденцы.

*Основные физико-химические свойства:* круглые, двояковыпуклые леденцы желто-коричневого цвета со вкусом меда и лимона.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Антисептическое комбинированное лекарственное средство для местного применения при инфекционных заболеваниях горла.

Препарат обладает антисептическими свойствами. Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов широкого спектра действия - амилметакрезола и спирта 2,4 дихлорбензилового, которые являются активными в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, пневмококки, фузобактерии и особенно *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Branhamella catarrhalis*) и оказывают противогрибковое действие. Они препятствуют присоединению вторичной бактериальной инфекции при вирусных заболеваниях верхних дыхательных путей.

Амилметакрезол разрушает структуру белков бактерий, обеспечивает бактерицидное действие. Спирт 2,4-дихлорбензиловый имеет бактериостатическое действие за счет обезвоживания бактериальной клетки. Натуральные лечебные добавки, входящие в состав препарата, уменьшают

болевые ощущения в горле, оказывают смягчающее действие на слизистую оболочку.

## **Фармакокинетика**

Системная абсорбция компонентов препарата низкая.

## **Показания**

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Особенности применения**

Если симптомы заболевания сохраняются более 2 дней и сопровождаются высокой температурой, головной болью, тошнотой, рвотой или другими проявлениями, необходимо обратиться к врачу. Не следует превышать указанную дозу.

С осторожностью применять больным эпилепсией, больным с нарушением сердечной проводимости, заболеваниями печени.

Пациентам с сахарным диабетом, необходимо учитывать, что препарат содержит сахарозу, раствор глюкозы.

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахараз-изомальтазы не следует применять этот препарат.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Применение препарата в рекомендуемой дозировке не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными

механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований применения комбинации спирта 2,4 дихлорбензилового и амилметакрезола в период беременности и кормления грудью не проводилось, но повышенного риска возникновения пороков развития, спонтанных абортс или уменьшение массы тела при рождении не ожидается. Не установлено, проникают ли спирт 2,4 дихлорбензиловый и амилметакрезол или их метаболиты в грудное молоко.

Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью, если только потенциальная польза лечения для матери не превышает возможные риски для развивающегося плода, или для младенца. Проконсультируйтесь с врачом перед применением в период беременности или кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Взрослые и дети в возрасте от 6 лет.

Рекомендуется принимать по 1 леденцу «Гексорал® Лорсепт со вкусом лимона» каждые 2-3 часа; максимальная суточная доза - 8 леденцов.

Медленно рассасывать один леденец во рту. Не жевать и не проглатывать целый леденец.

Продолжительность курса лечения составляет 5-7 дней.

## **Дети**

Не применять детям до 6 лет.

## **Передозировка**

Передозировка проявляется симптомами дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта (нарушение вкусовой чувствительности, тошнота, рвота, диарея). Возможно усиление проявлений побочных реакций. В таком случае следует прекратить.

## **Побочные реакции**

*Со стороны пищеварительной системы:* стоматит, жжение, пощипывание или боль во рту и горле, боль и отек губ, языка, горла, глоссит, глосодиния, диспепсия, тошнота.

*Со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек, крапивницу, эритема.

В случае возникновения каких-либо побочных реакций необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

4 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 4 леденцы в стрипе; по 2 стрипа в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Юник Фармасьютикал Лабораториз (отделение фирмы «Дж. Б. Кемикалз энд Фармасьютикалз Лтд.»).

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Округ № 101/2 и 102/1, Даман Индастриал Эстейт, Эйрпорт Роуд, село Кадайя, Даман - 396210, Индия.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).