

Состав

действующее вещество: ambazone;

1 леденец прессованный содержит амбазон моногидрат 10 мг;

другие составляющие: сахароза, лактозы моногидрат, какао, повидон К-30, кислота стеариновая, ароматизатор лимонный.

Лекарственная форма

Леденцы прессованные.

Основные физико-химические свойства: коричневые, не покрытые оболочкой, цилиндрической формы леденцы прессованные, с неповрежденными краями, плоские и с пигментированной поверхностью, с буквой «L» на одной стороне.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Амбазон. Код АТХ R02A A01.

Фармакодинамика

Амбазон является местным антисептиком, который обладает высокой активностью в отношении патогенных микроорганизмов, чаще всего вызывающих инфекции полости рта и верхних дыхательных путей: стрептококков, пневмококков, а также имеет умеренную противостафилококковую активность. Не влияет на кишечную микрофлору, следовательно, не вызывает дисбиоза пищеварительного тракта.

Кроме того, применение леденцов прессованных увеличивает слюноотделение и выделение природных бактерицидных веществ организма (таких как лизоцим) и вместе с этим увлажняет слизистую оболочку, уменьшает раздражение.

Показания

Симптоматическое лечение инфекций слизистой полости рта и носоглотки: гингивит, стоматит, тонзиллит, ангина, фарингит. Профилактика инфекционных осложнений после тонзиллэктомии и экстракции зубов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В настоящее время не сообщалось о взаимодействии препарата с какими-либо другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Поскольку леденцы Фарингосепт содержат сахарозу и лактозу, пациентам с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы или галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы или дефицитом лактазы Лаппа следует избегать применения препарата. Больным сахарным диабетом следует учитывать то, что леденцы содержат сахарозу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Нет контролируемых клинических исследований применения амбазона в период беременности или кормления грудью. Однако не поступало никаких данных о побочных реакциях или вредном влиянии на плод при применении амбазона в период беременности. Неизвестно, проникает ли амбазон в грудное молоко.

Леденцы Фарингосепт можно назначать в период беременности или кормления грудью только в том случае, если, по мнению врача, терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте от 7 лет составляет 3-5 леденцов (30-50 мг амбазона) в сутки в течение по меньшей мере 3-4 дней. Леденцы не следует глотать – их следует медленно растворить слюной в полости рта. Препарат обычно применяют сразу после еды (через 15-30 минут), после чего в течение 2-3 часов не следует принимать пищу и пить.

Рекомендованная доза детям в возрасте 3-7 лет – по 1 леденцу 3 раза в сутки (30 мг амбазона в сутки) в течение 3-4 дней.

Увеличение рекомендуемой дозы не влечет за собой улучшение терапевтического эффекта.

Дети

Не применять детям до 3 лет.

Передозировка

До сих пор не было зафиксировано случаев передозировки препаратом. Специфического антидота не существует. При применении очень большого количества леденцов Фарингосепт рекомендуется вызывать рвоту и/или промыть желудок.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности, в том числе отек Квинке, крапивница, зуд, гиперемия кожи лица, сыпь.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 леденцов в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

УК Терапия АД.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ул. Фабриции, 124, 400632, г. Клуж-Напока, округ Клуж, Румыния.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).