

Состав

действующие вещества: амилметакрезол, спирт 2,4 дихлорбензиловый;

1 леденец содержит амилметакрезола 0,6 мг, спирта 2,4 дихлорбензилового 1,2 мг;

вспомогательные вещества: сахароза, глюкозы раствор, кислота лимонная, масло анисовое, краситель желтый закат FCF (E 110), масло мяты, масло апельсиновое.

Лекарственная форма

Леденцы.

Основные физико-химические свойства: круглые, двояковыпуклые леденцы оранжевого цвета со вкусом апельсина.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Антисептическое комбинированное лекарственное средство для местного применения при инфекционных заболеваниях горла.

Препарат обладает антисептическими свойствами. Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов широкого спектра действия - амилметакрезола и спирта 2,4 дихлорбензилового, что являются активными в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, пневмококки, фузобактерии и особенно *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Branhamella catarrhalis*) и оказывают противогрибковое действие. Они препятствуют присоединению вторичной бактериальной инфекции при вирусных заболеваниях верхних дыхательных путей. Амилметакрезол разрушает структуру белков бактерий, обеспечивает бактерицидное действие. Спирт 2,4-дихлорбензиловый обладает бактериостатическим действием за счет обезвоживания бактериальной клетки. Натуральные лечебные добавки, входящие в состав препарата, уменьшают

болевые ощущения в горле, оказывают смягчающее действие на слизистую оболочку.

Фармакокинетика

Системная абсорбция компонентов препарата низкая.

Показания

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Если симптомы заболевания сохраняются более 2 дней и сопровождаются высокой температурой, головной болью, тошнотой, рвотой или другими проявлениями, необходимо обратиться к врачу. Не следует превышать указанную дозу.

С осторожностью применять больным эпилепсией, больным с нарушением сердечной проводимости, шоком, заболеваниями печени.

Пациентам с сахарным диабетом, необходимо учитывать, что препарат содержит сахарозу, раствор глюкозы.

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахараз-изомальтазы не следует применять этот препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Применение препарата в рекомендуемой дозировке не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований применения комбинации спирта 2,4 дихлорбензилового и амилметакрезола в период беременности и кормления грудью не проводилось, но повышенного риска возникновения пороков развития, спонтанных абортов или уменьшение массы тела при рождении не ожидается. Не установлено, проникают спирт 2,4 дихлорбензиловый и амилметакрезол или их метаболиты в грудное молоко. Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью, если только потенциальная польза лечения для матери не перевешивала возможные риски для развивающегося плода, или для младенца. Проконсультируйтесь с врачом перед применением в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослые и дети в возрасте от 6 лет.

Рекомендуется принимать по 1 леденцу «Гексорал® Лорсепт со вкусом апельсина» каждые 2-3 часа; максимальная суточная доза - 8 леденцов.

Медленно рассасывать один леденец во рту. Не жевать и не проглатывать целый леденец.

Продолжительность курса лечения составляет 5-7 дней.

Дети

Не применять детям до 6 лет.

Передозировка

Передозировка проявляется симптомами дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта (нарушение вкусовой чувствительности, тошнота, рвота, диарея). Возможно усиление проявлений побочных реакций. В таком случае следует прекратить.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительной системы: стоматит, жжение, пощипывание или боль во рту и горле, боль и отек губ, языка, горла, глоссит, глосодиния, диспепсия, тошнота.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек, крапивницу, эритему.

Лекарственное средство содержит краситель «Желтый закат FCF» (E 110),

который может вызвать аллергические реакции.

В случае возникновения каких-либо побочных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 ° С в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 4 леденцы в стрипе; по 4 стрипа в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта

Производитель

Юник Фармасьютикал Лабораториз (отделение фирмы «Дж. Б. Кемикалз энд Фармасьютикалз Лтд.»).

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Округ № 101/2 и 102/1, Даман Индастриал Эстейт, Эйрпорт Роуд, село Кадайя, Даман - 396210, Индия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).