

## **Состав**

*действующее вещество:* экстракт жидкий (60: 100) цветов подсолнечника (flores helianthi) (экстрагент - этанол 70%);

1 мл препарата содержит экстракта жидкого (60: 100) цветов подсолнечника (flores helianthi) (экстрагент - этанол 70%) (в пересчете на сухое вещество) 330 мг;

*вспомогательные вещества:* пропиленгликоль; метилпарабен (Е 218) пропилпарабен (Е 216) сахарин натрия кислота лимонная моногидрат, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Спрей оромукозний, раствор.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость желто-коричневого цвета со специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Различные антисептики.

Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Экстракт цветов подсолнечника - антибактериальный препарат природного происхождения. Биологически активные вещества, содержащиеся в нем содержатся, подавляют рост некоторых бактерий (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Bacillus subtilis*), а также вирус везикулярного стоматита. Кроме того, при местном применении препарат оказывает выраженное ранозаживляющее действие.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Острые респираторные заболевания, ангины, ларингиты, фарингиты, профилактика везикулярного стоматита.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Препарат усиливает действие других антибактериальных препаратов.

## **Особенности применения**

Флакон встряхивают в течение 1 мин и проводят не более 5 нажатий на насадку до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить операцию еще раз. Затем свободный конец распылителя ввести в полость рта и нажимать на головку клапана в течение 1-2 с, удерживая флакон вертикально.

Вспомогательные вещества могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные), а в отдельных случаях - бронхоспазм.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Поскольку никаких исследований применения препарата в период беременности и кормления грудью не проводилось, его применение не рекомендуется.

## **Способ применения и дозы**

Местно, путем орошения, на слизистые оболочки ротовой полости и носоглотки. Взрослым орошения проводят 3-4 раза в сутки. Длительность лечения зависит от интенсивности терапии и обычно составляет от 3 до 7 суток.

## **Дети**

Исследования по применению детям не проводились, поэтому препарат не рекомендуется.

## **Передозировка**

Не наблюдалось.

## **Побочные реакции**

Вспомогательные вещества могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные), а в отдельных случаях - бронхоспазм. Возможно возникновение ощущения жжения в задней части глотки, не требует отмены препарата.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 30 мл во флаконе с насосом-дозатором с распылителем, по 1 флакону в пачке из картона.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЗАО «Биолик».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 В.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).