

## **Состав**

*действующее вещество:* 100 мл раствора содержат не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O);

*вспомогательные вещества:* вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения.

Прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость.  
Гигроскопична.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.

## **Фармакодинамика**

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местно раздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

## **Фармакокинетика**

При местном применении не всасывается через кожу.

## **Показания**

1. Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях.
2. Для обтирания и компрессов.
3. Хирургическая обработка рук хирургов.

## **Противопоказания**

1. Повышенная чувствительность.
2. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

### **Особенности применения**

В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой.

Не допускать попадания препарата в глаза!

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук.

Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога, этанол следует развести водой в соотношении 1:1).

### **Дети**

Применяют по назначению врача.

### **Передозировка**

При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

### **Побочные реакции**

При местном применении возможно раздражение кожи или слизистых оболочек. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

**Срок годности**

5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить в хорошо закупоренной таре в недоступном для детей мест

**Упаковка**

По 100 мл во флаконах.

**Категория отпуска**

По рецепту.

**Производитель**

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).