

Состав

действующее вещество: этанол;

100 мл раствора содержит не менее 95,1% и не более 96,9% этанола по объему.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопична.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТС D08A X09.

Фармакодинамика

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местное раздражающее действие. Септил Плюс коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Проявляет "дубильное" действие на кожу и слизистые оболочки.

Фармакокинетика

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Для дезинфекции кожи рук.

Противопоказания

- острые воспалительные процессы кожи;
- повышенная чувствительность;
- возраст до 14 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особенности применения

Для компрессов (для предотвращения ожога) Септил Плюсслид развести водой в соотношении 1:1.

В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой.

Не допускать попадания препарата в глаза.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно - наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток. Особенности применения определяются врачом В каждом конкретном случае.

Дети

Не применять детям до 14 лет.

Передозировка

При наружном применении передозировка неизвестно.

Побочные реакции

Возможны раздражения кожи или слизистых оболочек.

Срок годности

Неограниченный.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в флаконах.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).